

## MISE AU POINT

### Maladie de Verneuil

# Complications, comorbidités et maladies associées à la maladie de Verneuil

**RÉSUMÉ :** La maladie de Verneuil est une affection fréquente, de diagnostic clinique facile mais souvent retardé. Une meilleure connaissance et prise en charge de la maladie pourrait diminuer l'impact sur la qualité de vie, la fréquence des complications cicatricielles et infectieuses, mais aussi la dégénérescence en carcinome épidermoïde, rare mais souvent létale.

Si l'association de la maladie de Verneuil avec le syndrome métabolique, l'excès de poids, l'obésité et le tabagisme est à présent bien établie, celle avec les maladies d'occlusion folliculaire, la maladie de Crohn, les spondylarthropathies et les syndromes auto-inflammatoires repose souvent sur des rapports de cas isolés ou des séries limitées. Une meilleure connaissance de la maladie et de sa physiopathologie devrait nous permettre de préciser ces associations.



→ E. MACCARI<sup>1</sup>, G. GABISON<sup>2</sup>

<sup>1</sup> HIA Bégin, SAINT-MANDÉ.

<sup>2</sup> Hôpital Henri-Mondor, CRÉTEIL.

Membres du réseau ResoVerneuil.

La maladie de Verneuil – ou hidrosadénite suppurée, ou hidradénite suppurée (HS), ou encore *acne inversa* – est une affection fréquente et de diagnostic clinique relativement facile. Elle est caractérisée par trois types de lésions : des nodules douloureux, des abcès pouvant se fistuliser et des cicatrices hypertrophiques en corde. Elle évolue de façon chronique et par poussées.

Si le diagnostic est aisé, il est souvent retardé et il s'écoule 8 ans en moyenne entre les premiers symptômes et l'établissement du diagnostic de la maladie. Les patients traînent ainsi, pendant des années, avec des diagnostics de furoncles ou de kystes chroniques. Ce retard diagnostique, ainsi que la chronicité et les récurrences des poussées, sont responsables de l'apparition de complications, qui peuvent être sévères et pourraient être évitées par une meilleure prise en charge.

De nombreuses maladies peuvent être associées à la maladie de Verneuil, fai-

sant discuter le caractère systémique de la maladie.

### Altération de la qualité de vie

La maladie de Verneuil retentit de façon sévère sur la qualité de vie des patients, même dans les formes modérées. Plus encore, les formes dites légères (65 % environ) ne le sont pas pour certains patients, dont la souffrance physique et psychologique est souvent très profonde. Ainsi, la qualité de vie peut être plus altérée que pour la neurofibromatose, l'urticaire, le psoriasis et la dermatite atopique [1]. Dans l'étude de Vazquez, réalisée à partir de bases de données, et visant à évaluer l'incidence de l'HS et à déterminer les caractéristiques de la maladie et ses comorbidités chez 268 sujets diagnostiqués au Minnesota entre 1968 et 2008, 43 % des patients de l'étude d'incidence étaient dépressifs et 21 % si on utilisait les échelles classiques de dépression (BDI-SF, MDI) [2, 3].