

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR  
**ALLERGODIL 0,05 % collyre en solution**  
(azélastine)

**Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

Vous devez toujours utiliser ce médicament en suivant scrupuleusement les informations fournies dans cette notice ou par votre médecin ou pharmacien.

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre pharmacien pour tout conseil ou information.
- Si vous ressentez l'un des effets indésirables, parlez-en à votre médecin ou pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4.
- Vous devez vous adresser à votre médecin si vous ne ressentez aucune amélioration ou si vous vous sentez moins bien.

**Que contient cette notice ?**

1. Qu'est-ce qu'ALLERGODIL 0,05% Collyre en solution et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser ALLERGODIL 0,05% Collyre en solution ?
3. Comment utiliser ALLERGODIL 0,05% Collyre en solution ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver ALLERGODIL 0,05% Collyre en solution ?
6. Contenu de l'emballage et autres informations.

**1. QU'EST-CE QU'ALLERGODIL 0,05% COLLYRE EN SOLUTION ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE ?**

Ce médicament est un antiallergique à usage ophtalmique.

Il est destiné à la: prévention et au traitement symptomatique de la conjonctivite allergique.

**2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER ALLERGODIL 0,05% COLLYRE EN SOLUTION ?**

**N'utilisez jamais ALLERGODIL 0,05% Collyre :**

- si vous êtes allergique (hypersensible) à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament mentionnés dans la rubrique 6.
- si vous portez des lentilles souples. Pour les autres types de lentilles, il est conseillé de les retirer avant application d'ALLERGODIL 0,05% Collyre et d'attendre au moins 15 minutes avant de les remettre.

**Avertissements et précautions**

Adressez-vous à votre médecin ou pharmacien avant d'utiliser ce médicament.

**Autres médicaments et ALLERGODIL 0,05% Collyre**

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez/utilisez d'autres médicaments ou si vous en avez récemment pris/utilisé ou pourriez prendre/utiliser tout autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance.

Aucune interaction n'est connue à ce jour.

**ALLERGODIL 0,05% Collyre avec aliments et boissons**  
sans objet

**Grossesse, allaitement e fertilité**

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, prévenez votre médecin. Seul ce dernier sera à même de décider si ALLERGODIL 0,05% Collyre doit être administré.

Veillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

sans objet

### **Informations importantes concernant certains composants d'ALLERGODIL 0,05% Collyre**

sans objet

## **3. COMMENT UTILISER ALLERGODIL 0,05% COLLYRE EN SOLUTION ?**

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les instructions de cette notice ou les indications de votre médecin ou pharmacien.

Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

### Dosage :

La dose recommandée chez l'adulte et l'enfant de plus de 4 ans est de 1 goutte dans chaque œil 2 fois par jour.

En cas de symptômes graves, on peut augmenter la dose à 1 goutte dans chaque œil 4 fois par jour.

Après administration, garder la paupière fermée pendant 1 à 2 minutes, maintenir le canal lacrymal fermé avec le doigt pendant 1 à 2 minutes.

Ne pas utiliser ALLERGODIL 0,05% Collyre plus de 4 semaines après la première ouverture du flacon.

N'arrêtez pas prématurément votre traitement, mais continuez le jusqu'à disparition des symptômes.

### **Si vous avez administré plus d'ALLERGODIL 0,05% Collyre que vous n'auriez dû :**

Si vous avez utilisé trop d'ALLERGODIL 0,05% Collyre, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-Poison (070/245 245).

En raison de l'application locale du médicament, un risque de surdosage n'est cependant pas à escompter.

Les symptômes d'un surdosage accidentel ou de prise par la bouche, comme révélés par les études réalisés chez les animaux, sont :

- somnolence,
- confusion,
- pouls rapide,
- baisse de la pression artérielle.

Consultez un médecin sans délai si vous ressentez ces symptômes.

Il n'existe pas d'antidote connu. Le traitement repose sur la correction des symptômes et la surveillance clinique.

### **Si vous oubliez d'utiliser ALLERGODIL 0,05% Collyre :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

### **Si vous arrêtez d'administrer ALLERGODIL Collyre :**

N'arrêtez pas brusquement votre traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

#### **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Fréquent (dans 1 à 10% des cas)

- Une irritation passagère peut être ressentie.

Rare (dans 0,1 à 1% des cas)

- Un goût amer a été rapporté.

#### **Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via Agence fédérale des médicaments et des produits de santé - Division Vigilance - EUROSTATION II - Place Victor Horta, 40/ 40 - B-1060 Bruxelles

Site internet: [www.afmps.be](http://www.afmps.be)

e-mail: [patientinfo@fagg-afmps.be](mailto:patientinfo@fagg-afmps.be)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### **5. COMMENT CONSERVER ALLERGODIL 0,05%COLLYRE EN SOLUTION ?**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Conserver à température ambiante (15-25°C).

N'utilisez ce médicament pas après la date de péremption indiquée sur la boîte après la mention "EXP". La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Ne pas utiliser plus de 4 semaines après la première ouverture.

N'utilisez pas ce médicament si vous remarquez des signes visibles de détérioration du produit et de son conditionnement.

Ne jetez aucun médicament au tout à l'égout ni avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

#### **6. CONTENU DE L'EMBALLAGE ET AUTRES INFORMATIONS**

##### **Ce que contient ALLERGODIL 0,05% Collyre**

- La substance active est l'azélastine.
- Les autres composants sont : methylhydroxypropylcellulose, édétate sodique, chlorure de benzalkonium, sorbitol, hydroxyde de sodium, eau pour injections.

##### **Aspect d'ALLERGODIL 0,05% Collyre et contenu de l'emballage extérieur**

Collyre en solution – flacon plastique de 6 ml.

##### **Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant**

Meda Pharma s.a. – Chaussée de la Hulpe 166 – 1170 Bruxelles

**Fabricant**

Meda Pharma GmbH & Co. KG – Benzstrasse 1 – D 61352 Bad Homburg

**Numéro de l'autorisation de mise sur le marché**

BE198536

**Mode de délivrance** : délivrance libre.

**La dernière date à laquelle cette notice a été mise à jour est : 10/2014.**

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est : 10/2014.**