

Bipacksedel: Information till användaren

Flutikason 2care4 50 mikrogram/dos nässpray, suspension

flutikasonpropionat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Flutikason 2care4 är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du använder Flutikason 2care4
3. Hur du använder Flutikason 2care4
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Flutikason 2care4 ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Flutikason 2care4 är och vad det används för

Flutikason 2care4 är ett kortisonpreparat, som motverkar inflammation och allergi redan i mycket små doser.

Flutikason 2care4 används vid snuva och nästäppa orsakad av allergi mot t.ex. pollen (s k hösnuva), djur eller damm. Flutikason 2care4 används även vid vasomotorisk snuva (s k rinnsnuva).

Flutikasonpropionat som finns i Flutikason 2care4 kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

2. Vad du behöver veta innan du använder Flutikason 2care4

Använd inte Flutikason 2care4

Om du är allergisk mot flutikasonpropionat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Varningar och försiktighet

Flutikason 2care4 har *inte omedelbar* effekt utan full effekt uppnås först efter några dagars regelbunden användning. Vid hösnuva bör behandlingen om möjligt sättas in innan pollenssäsongen börjar.

Vid allergiska symtom från ögonen eller under de första dagarna när du använder Flutikason 2care4 kan kompletterande behandling behövas.

Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbingar under tiden du använder Flutikason 2care4.

Vid långvarig användning av Flutikason 2care4 bör näslemhinnan kontrolleras varje halvår.

Andra läkemedel och Flutikason 2care4

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

Om Flutikason 2care4 används samtidigt med vissa andra läkemedel kan risken för biverkningar öka. Detta gäller t.ex. vid användning av:

- ketokonazol och itraconazol (mot svampinfektioner)
- erytromycin (antibiotika)
- ritonavir och kobicistat (mot hiv).

Din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

Graviditet

Det finns begränsad erfarenhet av användning av Flutikason 2care4 under graviditet.

Amning

Det är okänt om Flutikason 2care4 går över i modersmjölk.

Körförmåga och användning av maskiner

Studier saknas huruvida Flutikason 2care4 påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Flutikason 2care4 innehåller bensalkoniumklorid

Flutikason 2care4 innehåller bensalkoniumklorid som kan ge reaktioner på näslemhinnan och eventuellt kramp i luftrören.

3. Hur du använder Flutikason 2care4

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Doseringen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

Rekommenderad dosering är 1-2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång om dagen, helst på morgonen. Ta gärna doserna i samband med en daglig rutin, t.ex. tandborstning eller vid bestämda måltider för att lättare komma ihåg din dos.

Skaka nässprayen före användning.

Kontakt med ögonen bör undvikas.

Se ”Bruksanvisning” i slutet av denna bipacksedel.

Om du använt för stor mängd av Flutikason 2care4

Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Om du har glömt att använda Flutikason 2care4

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Flutikason 2care4 och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

- svullnad av ansikte, tunga eller svalg
- svårigheter att svälja
- nässelutslag och andningssvårigheter
- blodtrycksfall

Dessa symptom kan vara tecken på allvarliga överkänslighetsreaktioner såsom angioödem och anafylaxi som är mycket sällsynta biverkningar (*kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare*).

Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Lätt blodblandat nässekret.

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Torrhet/irritation i näsa och svalg. Huvudvärk. Obehaglig lukt eller smak av läkemedlet.

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

Sår på nässlemhinnan, hål i nässkiljeväggen. Orsaken till dessa biverkningar är oklar. Glaukom (grön starr), förhöjt tryck i ögat, katarakt (grå starr).

Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): Dimsyn.

Nysningar kan inträffa omedelbart efter sprayning.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Läkemedelsverket
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

5. Hur Flutikason 2care4 ska förvaras

Förvaras vid högst 25°C.

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är flutikasonpropionat 50 mikrogram/dos.
- Övriga innehållsämnen är: Vattenfri glukos, mikrokristallin cellulosa, karmellosnatrium, fenyletylalkohol, bensalkoniumkloridlösning, polysorbat 80, renat vatten.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Brungul glasflaska med dospump. Förpackningar om 120 och 360 (3x120) doser.
Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Importör/Ompackare:

2care4 ApS
6710 Esbjerg V
Tel. 08 – 68 40 98 40

Tillverkare:

TEVA-koncernen

Denna bipacksedel ändrades senast: 2017-11-24


Bruksanvisning

Läs noggrant igenom bruksanvisningen, innan du använder Flutikason 2care4.

Förberedelse av nässprayen:

Innan du använder en ny flaska med Flutikason 2care4 nässpray eller om sprayen inte har använts på en vecka, ska du ladda pumpen genom att skaka flaskan och spraya i luften tills en jämn dusch erhålls. Håll flaskan ifrån dig när du testsprayar i luften.

Skaka flaskan.
Ta av den genomskinliga hatten.
Håll sprayflaskan som på bilden.



Låt den vila på tummen och placera långfingret och pekfingret på var sin sida om flaskans spets.
Pumpa genom att med långfingret och pekfingret pressa nedåt mot tummen. Upprepa några gånger.

Användning av nässprayen:

Snyt ur näsan.
Skaka flaskan och ta av den genomskinliga hatten.
Håll sprayflaskan som på bilden.



Böj huvudet lätt framåt. Täpp till ena näsborren.
För in flaskans spets i andra näsborren och pumpa en gång.

Andas samtidigt lätt in genom näsborren.
Andas därefter ut genom munnen, innan sprayningen eventuellt upprepas en gång.
Upprepa proceduren i andra näsborren.

Torka av näsapplicatorn och sätt på plasthatten igen.

Överskrid inte doseringen!


Rengöring:

Rengör den vita plastdelen (näsapplicatorn) minst en gång i veckan. Rengör den oftare om den täpps till.

Peta inte med nål eller annat vasst föremål i näsapplicatorn.

Tag av den genomskinliga hatten.

Tag av näsapplicatorn från flaskan som på bilden.



Spola näsapplicatorn och hatten under rinnande varmt vatten.

Skaka av vattnet och låt lufttorka.

Sätt tillbaka näsapplicatorn och hatten på flaskan.

Om näsapplicatorn ”pluggar igen” kan den ligga i varmt vatten en stund. Skölj sedan med kallt vatten och låt lufttorka. Sätt tillbaka delarna.