Itämeren kalakannat Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta 13.9.2022

Erikoistutkija Jari Raitaniemi
Luonnonvarakeskus

Lohi – Itämeren pääallas ja Pohjanlahti

- ICES:ltä sama suositus vuodelle 2023 kuin kuluvalle vuodelle. ICES:n lohityöryhmä peruuntui Ukrainan sodan takia.
- Lohenkalastusta vain Saaristomerellä ja Pohjanlahdelle 4 merimailin sisäpuolisella merialueella.
- Ammatti- ja vapaa-ajankalastuksen kokonaissaalis merialueelta yhteensä enintään 75 000 lohta.
- Pohjalahden lohikantojen tila pääsääntöisesti hyvä, kun taas Baltian alueen kantojen tila pääsääntöisesti huono.
- EU:n neuvosto salli meriuistelun rajoitetusti Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahden ulappa-alueilla kuluvalle vuodelle. Meriuistelun määrästä ja saaliista kuluvana vuonna ei ole vielä saatavissa kattavia tietoja.

Lohi – Suomenlahti

- Ammattikalastuksen kokonaissaalis enintään 11 800 lohta (sama suositus kuin vuosille 2015–2022).
- Kalastusponnistusta ei tulisi kasvattaa ja kalastus tulisi kohdistaa istutettuun loheen.
- Alueen luonnonlohikantojen nykytila on pääsääntöisesti hyvä (3 jokea Virossa) ja ne kestävät suosituksen mukaisen kalastuksen.
- (Kymijoen lohella ei ole luonnonkantastatusta poikaistutuksien takia.)

Pohjanlahden silakka

Kanta-arvion mukaan kalastuskuolevuus on selvästi alle referenssi-arvojen, mutta kutevien kalojen biomassa on juuri ja juuri MSY $B_{trigger}$:in yläpuolella. kutevat silakat ovat poikkeuk-sellisen laihoja.

Saaliit



Poikasvuosiluokan runsaus



Kalastuskuolevuus



Kutevien kalojen biomassa



Esimerkkejä heikkokuntoisimmista silakoista syys-lokakuun vaihteesta 2021









Kuntokerroin = $\frac{\text{paino}}{\text{pituus}^3}$

Pienet silakat pääosin hyväkuntoisia, kookkaat laihoja

Pääaltaan silakka

Kalastuskuolevuus Edelleen yli F_{MSY}:n ja F_{pa}:n, kutevien kalojen biomassa hiukan alle MSY $B_{trigger}$:in. Kiintiösuositus on edelleen pieni.

Saaliit



Poikasvuosiluokan runsaus



Kalastuskuolevuus



Kutevien kalojen biomassa



Itämeren kilohaili

Heikko turskakanta
=>
runsas kilohaili

Kilohailikannan runsastuminen heikentää pääaltaan silakkakannan elpymisen mahdollisuutta (ks kutubiomassat 1980-luku, 2010-luvun alkupuoli).

Runsaan kilohailikannan aikana on esiintynyt lohen M74-syndroomaa.

Saaliit



Poikasvuosiluokan runsaus



Kalastuskuolevuus



Kutevien kalojen biomassa



Itämeren itäinen turskakanta

Kanta heikko, kalastuksen lopettaminenkaan ei välttämättä saa kantaa elpymään.

Turskakannan ydinalueiden pohjien hapettomuus on pääsyy huonoon tilanteeseen. Ravinnon-puute ja loiset (maksamato) vaivaavat turskia eteläisellä Itämerellä.

Saaliit



Poikasvuosiluokan runsaus



Kalastuskuolevuus



Kutevien kalojen biomassa



Kaikuluotauksissa havaitut yksilömäärät

Itäinen turskakanta



Kilohaili



Silakka



Huom. erilaiset mittakaavat

Kiitos!

Luke
LUONNONVARAKESKUS