

WWF:n näkemykset vuoden 2025 kalastuskiintiöistä Itämerelle

Maa- ja metsätalousvaliokunta 20.9.2024

Matti Ovaska, WWF Suomi


Kuva: Katri Virtalaakso / WWF

Pohjanlahden lohikannat

WWF katsoo, että kaikki luonnonlohikantoihin kohdistuva kalastus tulee keskeyttää ensi vuodeksi.

Perustelut:

- Emokalamäärät jääneet -23 ja -24 hälyttävän pieneksi, eikä edes vahvimmat joet pysty tuottamaan kestävän tason (MSY) mukaista määrää vaelluspoikasia.
- Taustalla korkea kuolleisuus merivaelluksen aikana, mutta tarkkaa syytä ei tiedetä. Mikään ei toistaiseksi viittaa tilanteen paranemiseen.
- Pohjanlahden pienet lohikannat erityisen suuressa vaarassa.
    - Esim. Ruotsin Rickleån-jokeen noussut elokuun loppuun mennessä vain 26 lohta.
- WWF katsoo, että Pohjanlahden lohenkalastus ei enää täytä yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteita.



Lähde: Luonnonvarakeskus

Suomenlahden lohi

Suomenlahden lohenkalastus tulee kohdistaa istutettuihin lohiin, eikä kalastuskuolevuutta tule nostaa nykytasosta.

Kalastuksen avaaminen tulee siirtää nykyistä myöhemmäksi, jolloin valtaosa Pohjanlahden luonnonlohista on jo ohittanut Suomenlahden.

Perustelut:

- Suomenlahdella valtaosa saaliista on istutettua lohta.
- ICES:n mukaan 28 % Suomenlahden lohisaaliista on luonnonkaloja Pohjanlahden joista.
- Kalastuskauden aloituksen siirtäminen myöhemmäksi säästäisi Pohjanlahden jokiin suuntaavia emokaloja.
- Lisäksi syytä säästää Kymijoessa syntyneitä villejä lohia alueellisilla toimenpiteillä.

Pohjanlahden silakka

WWF katsoo, että kalastuskuolevuutta ei tulisi nostaa nykytasosta, vaan kiintiö tulisi asettaa kuluvan vuoden tasolle (55 000 tonnia).

Perustelut:


- Pohjanlahden silakkakannassa on nähtävissä pitkään jatkunut laskeva trendi ja päivitetyn kanta-arvion mukaan kannan tila on tällä hetkellä MSY-tasoa (Btrigger) pienempi.
- Vanhempien (5+ vuotiaiden) silakoiden osuus on pieni ja tulee myös säilymään tavanomaista pienempänä.
- Pohjanlahden silakkakannan geneettinen monimuotoisuus voi olla vaarassa, sillä silakkakanta koostuu perinnöllisesti erilaisista osa-kannoista, joiden tilaa ei tunneta tarkasti.
- Silakan merkitys Pohjanlahden ekosysteemille ja muille lajeille erittäin suuri.
- Tällä hetkellä olisi viisainta pidättäytyä kalastuskuolevuuden kasvattamisesta, kunnes kannan tila ja kannan ikärakenne ovat jälleen hyvällä tasolla.

Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakka

WWF katsoo, että kiintiö tulisi asettaa korkeintaan kuluvan vuoden tasolle (40 368 tonnia) silakkakantojen nopean elpymisen turvaamiseksi.

Perustelut:

- Kalakannan tila vain niukasti kriittisen varotason (Blim) yläpuolella.
- Komission esityksen hyväksyminen tarkoittaisi yli 100 prosentin lisäystä kuluvan vuoden kiintiöön.
- Silakan ja kilohailin sekakalastus, saalisraportoinnin epätarkkuudet ja kalastuksen epätasainen alueellinen jakautuminen lisäävät ylikalastuksen riskiä.
- Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden säätelyalueella tulee viipymättä siirtyä tarkempaan osa-alue- ja populaatiotason tarkasteluun.




ICES. 2024. Herring (*Clupea harengus*) in subdivisions 25–29 and 32, excluding the Gulf of Riga (central Baltic Sea).

Kilohaili

Kilohailin osalta WWF suosittelee asettamaan kiintiötason komission esityksen mukaisesti siten, että EU:n TAC olisi korkeintaan 117 070 tonnia.

Perustelut:

- Kanta ollut pitkään tavoitetasolla, mutta kolme edellistä vuosiluokkaa huolestuttavan pieniä.
- Kalastuskuolevuus ollut pitkän kestävää tasoa suurempi.
- Lisäksi syytä huomioida kalastuksen epätasainen alueellinen jakautuminen sekä kilohailin vaikutus turskakannan elpymiseen.



ICES. 2024. Sprat (*Sprattus sprattus*) in subdivisions 22–32 (Baltic Sea).



Kiitos!

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme ympäristöongelmia
– luonnon ja ihmisten hyväksi

together possible™