


Suomen ympäristökeskuksen asiantuntijalausunto

Markku Mikkola-Roos
Erikoissuunnittelija


Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral
Finnish Environment Institute

Valkoposkihanhi




AEWA

1,4 milj. yksilöä




Satovahingot aiheutuvat n. miljoonan arktisen kannan yksilön ruokailusta muuttoreitin varrella itäisessä ja kaakkoisessa Suomessa



Suomen pesivä kanta
27 000 yksilöä

Valkoposkihanhien yksilömäärä syyskuun alussa 2008-2024



Kuva: BirdLife Suomi

Merimetso Itämerellä

Vakiintunut kanta

Tanska, Saksa, Puola, Liettua, Suomi, Venäjä

Kasvava kanta

Ruotsi, Viro

Koko Itämeren kanta


162 000 paria vuonna 2012

220 000 paria vuonna 2022



Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral
Finnish Environment Institute

Merimetson pesämäärät Suomessa 2015-2024



Suomen ympäristökeskus
Finlands miljöcentral
Finnish Environment Institute

Lajien siirtäminen riistalajeiksi

Valkoposkihanhi ja merimetso ovat luokiteltu Suomessa elinvoimaisiksi (Least Concern, LC) vuoden 2019 kansainvälisen luonnonsuojeluliiton (IUCN) ohjeistuksen mukaisessa uhanalaisuusarvioinnissa. Molempien lajien kannat ovat EU:n alueella suotuisalla suojelutasolla.

Suomen ympäristökeskus katsoo, että valkoposkihanhi voidaan lajin suojelutasoa vaarantamatta poistaa Bernin sopimuksen liitteestä II ja molemmat lajit voidaan siirtää lintudirektiivin liitteeseen II/B.

Valkoposkihanhen kohdalla huomioitavaa

Keväällä lintujen pesimäaikaan poikkeusluvilla tapahtuvaa valkoposkihanhien metsästystä ei tule sallia. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimustulosten mukaan vastaava häirintävaikutus voidaan toteuttaa paukkupatruunoilla.

Suomessa pesivä kanta aiheuttaa paikallisia haittoja lähinnä kaupungeissa eikä niiden torjuminen ole mahdollista metsästyksen avulla. Suomessa pesivän kannan kohdalla on lupaviranomaisen kyettävä arvioimaan, tarvitaanko vahingoittamattomaan karkottamiseen poikkeuslupaa ja miten mahdollinen karkottaminen toiselle alueelle onnistuu.

Merimetson kohdalla huomioitavaa

Luken tutkimusten perusteella ei ole näyttöä siitä, että merimetso vaikuttaisi merkittävästi kalojen kutu- ja poikastuotantoon. Näin ollen merimetson vaikutukset kutu- ja poikastuotantoon eivät ole riittävä yleinen peruste lintujen pesimäaikaisille poikkeusluville. Lisäksi tulee huomata, että nykyinen tietopohja kalojen kutualueista on riittämätön. Poikkeuslupien edellytyksenä tulee kutualueiden kohdalla olla Luken asiantuntijalausunto.


Kiitos!