Itämeren kalastuskiintiöt vuodelle 2026

Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta
26.9.2025

Erikoistutkija Atso Romakkaniemi
Luonnonvarakeskus


Lohi – Itämeren pääallas ja Pohjanlahti


- ICES suositteli vuodelle 2026 lohenkalastusta vain Pohjanlahden rannikolle kesällä (aikavälillä 1.5.–31.8. kaupallinen ja vapaa-ajankalastuksen kokonaissaalis enintään 30 000 lohta). Komission kiintiöehdotus on ICESin suosituksen mukainen.
- Syynä Baltian maiden pienten jokien heikko tila. Perämeren jokikantojen tila on arvioitu ICESissä edelleen kalastusta kestäväksi.
- Osassa Pohjanlahden jokia tilanne keskimääräistä heikompi 3 viime vuoden aikana, jonka takia ICES tuo esiin keinoja suojella näistä varsinkin pienimpien jokien (erit. Rånejoki) lohia
  - → Komissio on poiminut näistä ICESin lisäesityksistä kalastuksen myöhentämisen Ahvenanmerellä alkamaan 1.6. lähtien
- **Luonnonvarakeskus tukee valtioneuvoston kantaa noudattaa ICESin neuvoa.**


Lohi – Suomenlahti


- ICES suosittelee kaupallisen kalastuksen kokonaissaaliiksi enintään 11 800 lohta (saman suuruinen suositus kuin vuosille 2015–2024).
- Alueen luonnonlohikantojen (3 jokea, Viro) nykytila on hyvä.
- Kymijoen lohella ei ole luonnonkantastatusta poikaistutuksien takia.
- **Luonnonvarakeskus tukee valtioneuvoston kantaa noudattaa ICESin neuvoa.**


Vaelluspoikastuotanto
(luonnonkannat, *1000)













Kantojen tila poikastuotannossa 2024

- ≥R_{MSY}
- >R_{lim}, <R_{MSY}
- ≤R_{lim}

Kriteerit ref.tason saavuttamiseen:
Todennäk. >50% (R_{lim}), ≥50% (R_{MSY})


Lähde: ICES 2025





Lohen post-smolttien eloonjääänti heikentynyt ja siten pienentänyt aikuislohimääriä

Vaelluspoikasten eloonjäänti meressä 1. vuoden yli



Syönnöksellä olevien lohien kokonaismäärä (milj. yks.)



Pohjanlahden silakka

- ICESin kokonaiskiintiösuositus (TAC) **55 869–62 684 tonnia**
- Neuvonanto on huomioinut sen, että kutevan kannan biomassan on arvioitu vuonna 2025 olevan pienempi kuin $MSYB_{trigger}$
- Silakat nykyisin lihavia, ison silakan (yli 18 cm) osuus kasvoi hieman ja kasvanee edelleen
- Hyvät silakkasaaliit ICESin neuvonannon jälkeen kevään 2025 rysäkalastuksessa
- **Luonnonvarakeskus tukee valtioneuvoston kantaa noudattaa ICESin neuvoa**

Fishing pressure on the stock is below F_{MSY}, and spawning-stock size is below MSY $B_{trigger}$ but above B_{PA} and B_{lim}.




Figure 1 Herring in subdivisions 30 and 31. Summary of the stock assessment. The assumed recruitment value for 2025 is shaded in a lighter colour.

Pääaltaan ja Suomenlahden silakka

- ICESin kokonaiskiintiösuositus (TAC) **120 378 – 157 996 tonnia**
- Neuvonanto on huomioinut sen, että kutevan kannan biomassan on arvioitu vuonna 2025 olevan pienempi kuin $MSYB_{trigger}$
- Suurimmat kannan tiheydet Suomen lähivesillä
- Hyvät silakkasaaliit ICESin neuvonannon jälkeen kevään 2025 rysäkalastuksessa
- **Luonnonvarakeskus tukee valtioneuvoston kantaa noudattaa ICESin neuvoa**




Figure 1 Herring in subdivisions 25–29 and 32, excluding the Gulf of Riga. Summary of the stock assessment. The full time-series of recruitment, fishing pressure and spawning-stock biomass are available in the Baltic Fisheries Assessment Working Group (WGBFAS) report (Table 4.2.11 in ICES [2025a]). The predicted recruitment values for 2024 and 2025 are shaded in a lighter colour.

Itämeren kilohaili

- ICESin kokonaiskiintiösuositus (TAC) **176 056–230 518 tonnia**
- Peräkkäiset heikot vuosiluokat 2021–2023 ja iso vuosiluokka 2024
- Kannan biomassa yli $MSYB_{trigger}$:in
- Runsas vuosiluokka mahdollistaa kiintiön kasvattamisen
- **Luonnonvarakeskus tukee valtioneuvoston kantaa noudattaa ICESin neuvoa**




Figure 1 Sprat in subdivisions 22–32. Summary of the stock assessment. The diamond in the spawning-stock biomass (SSB) panel indicates that SSB at spawning time is predicted for 2025.

Luke

Itämeren muut kalakannat

- Merkitykseltään suhteellisen pieniä Suomen kalastukselle
- **Luonnonvarakeskus tukee valtioneuvoston esityksiä** näiden kalakantojen EU:n kalastuskiintiöksi ICESin suositusten mukaan
- Sivusaaliskiintiöiden (turska) voimakas pienentäminen nollakiintiölajeille voi aiheuttaa ongelmia muiden lajien kalastusmahdollisuuksien hyödyntämisessä

Kiitos!

atso.romakkaniemi@luke.fi