

WWF:n näkemykset vuoden 2027 kalastuskiintiöistä Itämerelle

Maa- ja metsätalousvaliokunta 2.10.2026

Matti Ovaska, WWF Suomi

Pohjanlahden silakka

- WWF ei voi hyväksyä valtioneuvoston esitystä, joka perustuu otsikkotason neuvonannon noudattamiseen.
  - Kanta on kestävän tason (MSY Btrigger) alapuolella, mutta jopa otsikkotason neuvonannon alarajan (FMSY lower) noudattaminen vuonna 2027 johtaisi **kutukannan biomassan pienenemiseen vuonna 2028.**
- Suhtaudumme varovaisen myönteisesti komission ehdotukseen Pohjanlahden silakan osalta, koska sen ennustetaan johtavan edes pieneen biomassan kasvuun.
- Suosittelemme kuitenkin vielä alempaa TAC-tasoa (45 544 tonnia), joka kasvattaisi kannan biomassan MSY Btrigger -tason yläpuolelle eli mahdollistaisi kannan elpymisen

Table 2 Herring in subdivisions 30 and 31. Annual catch scenarios. All

Basis	Total catch (2027)	$F_{ages3-7}$ (2027)	Spawning-stock biomass (SSB; 2028)	% SSB change*
ICES advice basis				
EU multiannual plan (MAP)^^: F_{MSY} × SSB(2027)/MSY $B_{trigger}$	90 391	0.210	570 390	−3.5
EU MAP^^: MAP range F_{lower} × SSB(2027)/MSY $B_{trigger}$	80 767	0.186	579 600	−1.95
Other scenarios				
F = 0	0	0.000	657 124	11.2
F_{MSY}	93 506	0.218	567 410	−4.0
F_{lower}	83 581	0.193	576 907	−2.4
F_{PA} = $F_{MSY\ upper}$	93 506	0.218	567 410	−4.0
F_{upper} × SSB (2027)/MSY$B_{trigger}$	90 391	0.210	570 390	−3.5
SSB (2028) = B_{lim}	280 673	0.812	389 930#	−34
SSB (2028) = B_{PA}	146 626	0.361	516 710#	−13
SSB (2028) = MSY $B_{trigger}$	45 544	0.102	613 360#	3.8
SSB (2028) = SSB (2027)	68 736	0.157	591 123#	0.00
F = F_{2025}	57 308	0.129	602 076	1.85
P(SSB [2028] < B_{lim}) < 5 %	134 473	0.327	528 290	−10.6

ICES Advice 2026 – her.27.3031 https://doi.org/10.17895/ices.advice.30932087

Keskinen silakka

- **Tuemme vahvasti komission ehdotusta**, joka tähtää kannan elpymiseen tavoitetasolle. Ehdotus perustuu FMSY lower -tasoa pienempään kalastuskuolevuuteen, ja kaikista nollaa suuremmista saalisvaihtoehdoista se antaa suurimman todennäköisyyden kannan elpymiselle MSY Btrigger -tason yläpuolelle.
- Komission ehdotus pitäisi suhteellisen kalastuskuolevuuden nykyisellä tasolla ja **tarkoittaisi käytännössä huomattavaa, 49 prosentin TAC kasvua viime vuoteen verrattuna.**
- Tätä suurempi kiintiötaso ei WWF:n näkemyksen mukaan edistäisi elinkeinon, ympäristöjärjestöjen ja valtioneuvoston yhteistä näkemystä välttää kalastuskiintiöiden suuria vuosien välisiä vaihteluita.

Lohi

- **Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohen osalta** WWF tukee komission ehdotuksen ja valtioneuvoston esityksen mukaista kiintiötä.
- WWF korostaa, että lohenkalastuksen kestävään tasoon liittyy suuria epävarmuuksia merivaiheen kuolleisuuden vuoksi. Tämän vuoksi **kansallisilla säätelytoimilla tulee varmistaa erityisesti aikaisin vaeltavien suurten yksilöiden suojelu**.
- Useat pienemmät Pohjois-Ruotsin lohikannat ovat edelleen kriittisen alhaisella tasolla, ja kolmen edellisen heikon vuoden vaikutus tulee vääjäämättä vaikuttamaan lohikantojen tilaan vielä useamman vuoden. Lohen kokonaistilanne on siten edelleen epätasainen ja epävarma.
- **WWF vastustaa jyrkästi valtioneuvoston kannassa esitettyä mahdollisuutta lohen ajosiimakalastuksen avaamisesta neljän merimailin ulkopuolella**.
  - ICES:n neuvonanto ja siihen sisältyvä poikkeus Pohjanlahdella tapahtuvan lohen rannikkokalastuksen osalta perustuu puhtaasti siihen, että Suomen ja Ruotsin rannikkokalastuksessa, kuten myös vapaa-ajankalastuksessa, kalastetaan kutuvaelluksella olevia lohia. Ajosiimakalastus sen sijaan kohdistuisi syönnöksellä oleviin lohiin, eikä ole näin ollen linjassa ICES:n neuvonannon kanssa.
- **Suomenlahden lohenkalastus tulee kohdistaa ICES:n neuvonannon mukaisesti istutettuihin lohiin**, eikä kalastuskuolevuutta tule lisätä nykytasosta. Erityisesti alkukauden pyynnissä Suomenlahdella kalastetaan myös Perämeren luonnonkannoista olevia kaloja, joten **kalastuksen aloitusajankohtaa tulee siirtää myöhemmäksi.**

Yleiset huomiot

- Tällä hetkellä tärkeintä ja kiireellisintä on **asettaa kalastuskuolevuus sellaiselle tasolle, joka mahdollistaa taantuneiden kalakantojen elpymisen tavoitetasolle** eli MSY Btrigger-tason yläpuolelle.
- Kalakantojen säätelyssä ja sitä ohjaavan tieteellisessä neuvonannossa tulee soveltaa **nykyistä laajempaa lähestymistapa** siirtymällä pois yksittäisten kalakantojen suurimpien mahdollisten saaliiden tarkastelusta ja pyytämällä **elpymiseen tähtäävää** ja laaja-alaisempaa tieteellistä neuvonantoa.
- Kalakantojen pitkän aikavälin tuottavuutta ei kuitenkaan voida varmistaa ainoastaan kalastuksen säätelyllä. Pidemmällä aikavälillä on välttämätöntä parantaa Itämeren tilaa ennallistamistoimien, kuten vaelluskalojen nousuesteiden purkamisen, ravinnekuormituksen vähentämisen sekä meriympäristön ennallistamisen ja suojelun avulla.



Kuva tehty tekoälyllä



Kiitos!

Suojelemme luontoa ja ratkaisemme ympäristöongelmia
– luonnon ja ihmisten hyväksi

together possible™