

Lidka

Ile zaleca Pani doktor badań prenatalnych niektórzy mówią że 2 niektórzy 3 (mama po 35 roku życia)

Oczywiście 3! III badanie prenatalne jest niezwykle istotne, a bywa pomijane. Część nieprawidłowości strukturalnych podczas badania II trymestru może zostać niewidoczna, albo słabo zaznaczona. A dopiero pełna manifestacja wady pojawia się właśnie w III trymestrze. Dobrym przykładem są problemy echokardiograficzne. Podczas badania II trymestru np. obserwujemy dyskretną dysproporcję jam serca na korzyść strony prawej, a w III ta nieprawidłowość jest już na tyle wyraźna, że trudno jej nie zauważyć. Dodatkowo zaburzenia trendu wzrastania także najczęściej dotyczy III trymestru.

Nikola

czy po utracie dziecka we wcześniejszej ciąży(10 tyg) powinienam wykonać badania prenatalne ?

Każda Pacjentka powinna wykonać badania prenatalne, a w przypadku sytuacji o której Pani wspomina jest ono jak najbardziej uzasadnione.

Nikola

kiedy powinniśmy wykonać test Pappa ?

Pomiędzy 11. a 13. tygodniem ciąży.

Ola_93

Po teście PAPPa + USG ryzyko ZD i innych chorób wyszły bardzo nisko. Jednak czy spotkała się Pani, że testy wykazywały minimalne ryzyko a jednak dziecko urodziło się z wadą genetyczną? Czy ewentualnie podczas badań USG da się jeszcze później taką wadę wykryć?

Niestety taka sytuacja może mieć miejsce. Na stężenie białka PAPP-A i bhCG ma wpływ wiele czynników. Dodatkowo taka sytuacja może mieć miejsce w ciąży wielopłodowej. Kalkulacja ryzyka obejmuje: wywiad + badanie biochemiczne + badanie USG. Podczas kolejnych badań USG jak najbardziej możemy wykryć nieprawidłowości będące składową wad genetycznych. Aby mieć pewność polecam badanie nieinwazyjne: ocena wolnego płodowego DNA (cffDNA). Jediną wadą badania jest koszt.

Ola

Jaka jest procentowo pewność, że wykonywane badania prenatalne dadzą pewność co do zdrowia płodu? Czy jest szansa, że badania prenatalne nie wykryją jakiś wad które dziecko posiada, dadzą wynik fałszywie negatywny/pozytywny?

Nikola

jeśli takie badania są pewne w 100 % ?

Agnieszka

Czy po wykonaniu pierwszego badania prenatalnego, prawidłowym wyniku, można nie wykonywać pozostałych? Często spotykam się z takimi zdaniami

Nie zgadzam się z tą opinią. Każdej Pacjentce rekomendujemy III badania prenatalne - każde ma inny cel.

Lidka

W pierwszym badaniu prenatalnym lekarz napisał samoistny poród przedwczesny przed 34 tygodniem- ryzyko skorygowane 1:494 czy jest się czym martwić? drugi lekarz z Którym omawiałam badania mówi że to "wróżenie z fusów" (zaszłam w ciążę mając 34 lata)

Nikola

czy badania prenatalne można wykonać na NFZ ?

Tak, ale jest lista określonych wskazań, aby takie badania wykonać nieodpłatnie, np. wiek matki > 35 r.ż.

Agnieszka

Czy poronienie bądź nadciśnienie tętnicze jest wskazaniem do wykonania testu Pappa?

W szczególności poronienie w wywiadzie jest wskazaniem do wykonania badania prenatalnego.

Agnieszka

Jak najpóźniej, w którym tygodniu z Pani doświadczenia możemy usłyszeć, zobaczyć bicie serca płodu?

Czynność serca płodu jest widoczna już pod koniec 5. tygodnia ciąży, u zarodka mierzącego 2 mm. Natomiast zdarza się (10%), że nie stwierdzamy akcji serca płodu, wówczas zaleca się dalsze monitorowanie. U zarodka, który mierzy 4 mm czynność serca powinna być bezwzględnie widoczna.

Ola_93

Syn podczas każdego USG jest 200-300g większy niż wynika to z siatki centyli. Nie jest możliwe, aby był starszy niż wyliczenie z miesiączki. Brak cukrzycy ciążowej. Czy jest się czym przejmować czy to taka jego uroda? Jak się urodziłam miałam prawie 4 kg, mąż 3,8kg.

Pani Olu, bardzo trafnie przytacza Pani masę urodzeniową swoją i Męża. Z dużym prawdopodobieństwem można spodziewać się, że Państwa Maluszek osiągnie podobne wartości, co wynika z czynników konstytucjonalnych. Jeżeli została wykluczona cukrzyca ciążowa, a także inne choroby, które mogą być przyczyną makrosomii płodu może być Pani spokojna.

Agnieszka

Czy przy wyliczaniu masy dziecka poprzez badanie usg zawsze trzeba brać pod uwagę możliwość błędu +/- 500g?

Nie zawsze jest to +/- 500 g – jest to uzależnione od czasu badania. Na wyższym etapie trwania ciąży będzie to większa wartość. Ale co jest istotne, lekarz wykonujący badanie nie jest w stanie dokładnie oszacować masy płodu (aparat USG nie jest wagą☺), i zawsze będzie to wartość +/- ...g. Pomiar będzie mniej dokładny chociażby w przypadku suboptymalnego ułożenia płodu, kiedy uzyskanie skanów do pomiarów biometrycznych jest niemalże niemożliwe.

Ola_93

w 20 tc miałam kontakt z chorym na tężec (brak wiedzy na ten temat wówczas). Po 2 miesiącach brak objawów u mnie. W przedszkolu przesłam ospę wietrzną. Czy była możliwość bezobjawowego przejścia

choroby wirusowej i czy mogło to zaszkodzić dziecku? Czy należałoby zrobić jakieś dodatkowe badania?

Paulina

dziecko z pomiarów mniejsze o 1 tydzień i 5 dni, w 24+4? jestem przed konsultacją, czy mogę mieć nadzieję, że dziecko jeszcze nadrobi wymiary i wagę i wszystko jeszcze w ciąży będzie standardowo?

Zaburzenia trendu wzrastania zawsze budzą niepokój wśród przyszłych Rodziców. Mają one bardzo szeroko rozbudowaną etiologię – a zatem przyczyn może być wiele, w tym bardzo prozaiczna jak potencjał konstytucjonalny. Otóż, Dziecko drobnych, niskich Rodziców nie będzie wysokie, i wówczas w okresie prenatalnym można obserwować sytuację, o której Pani pisze. Proszę pamiętać, że zakres błędu to +/- 2 tygodnie. Pani Maluszek mieści się na razie w tym przedziale. Ważne, aby monitorować trend wzrastania w interwałach początkowo 2-tygodniowych z oceną dobrostanu Płodu. W przypadku zahamowania wewnątrzmacicznego wzrastania zalecana jest hospitalizacja. Co istotne, pomiarów biometrycznych powinien dokonywać 1 lekarz, na tym samym aparacie.

Ola

jakich częstych chorób nie wykrywają badania USG?

Agnieszka

Co wtedy jeśli dojdzie do zakażenia wewnątrzmacicznego w wyniku powikłania badania inwazyjnego? Czy wiąże się to z pobytem w szpitalu?

Lidka

Kiedy najlepiej zaszczepić się na krztusiec w którym tygodniu ciąży

Zgodnie z Rekomendacjami zaleca się, aby dawkę przypominającą dTpa podać ciężarnym w III trymestrze ciąży (27.-36 t. c.), a najbardziej optymalnym czasem jest okres pomiędzy 28 a 32 t. c.- co przekłada się na dłuższy okres utrzymywania się przeciwciał we krwi dziecka.

Justyna

Podczas badań prenatalnych pierwszego trymestru lekarz stwierdził u mnie dysmorfie twarzy i zalecił stawienie się w klinice genetycznej ze skierowaniem. Co to może oznaczać dla zdrowia dziecka ? Z jakimi chorobami może się to wiąże.

Lidka

Miałam pilne wycięcie znamion (znieczulenie miejscowe) czy to mogło zaszkodzić dziecku byłam w 24 tc

Okres organogenezy, czyli czas kiedy działanie czynników zewnętrznych ma największy wpływ na rozwój Maluszka został już zakończony, a zatem tego rodzaju znieczulenie nie wpłynie na dalszy rozwój płodu.

Agnieszka

Czy masa urodzeniowa dziecka powyżej 2500 g a poniżej 3000g kwalifikuje go do grupy niskiej masy urodzeniowej? Czy masa urodzeniowa może być dziedziczna?

O niskiej masie urodzeniowej mówimy wówczas, gdy nie przekracza 2500 g. Tak masa urodzeniowa może być dziedziczna – jest czynnik konstytucjonalny.

Ola_93

Czy warto aby ojciec dziecka też się zaszczepił na krztusiec?

Najważniejsze, aby zaszczepiła się przyszła Mama. Dzięki temu zostaną przekazane przeciwciała. Natomiast w przypadku populacji „nieciążarnej” zachęcam do oznaczenia miana przeciwciała i w przypadku niskiego do rozważenia podanie dawki przypominającej.