

Katarzyna

jak oduczyć dziecko żeby piło z piersi bez nakładki na sutek?

Marta

czy decydować się na zabieg Credego u noworodka?

Zabieg Credego jest profilaktyka przed rzeżączkowym zapaleniem spojówek, które może doprowadzić do ślepoty. Rzeżączka może przebiegać w postaci bezobjawowej.

Katarzyna

"przeszłam" wielu lekarzy i położnej i mało kto sam od siebie bada piersi na każdym etapie.

Jagoda

kiedy dokładnie wybrać się do szpitala (w sensie co jaki czas trwania skurczów), jeśli chcemy skorzystać ze znieczulenia zewnątrzoponowego przy dodatnim gbs?

W przypadku GBSa konieczne jest podanie antybiotyku 4g przed porodem. Najlepiej wybrać się w momencie kiedy mamy regularną akcję skurczową od godziny, a skurcze są co 5min i częściej.

Katarzyna

W szpitalu w Knurowie również można rodzić ☐

Jagoda

co w przypadku dodatniego wyniku wymazu covid przy braku objawów u matki? czy szpital może zdecydować o CC?

Tak. . Może zapisać decyzję o cięciu cesarskim. Powołując się na krajowe zalecenia

Marta

Mam termin porodu za 3 tygodnie, czy jest taka możliwość, że zostanę odesłana do innego szpitala ze względu na brak miejsc?? Wybrałam szpital w Mysłowicach?? jeśli tak, to gdzie się udać?

Miejmy nadzieję, że taka sytuacja nie będzie miała miejsca. Przed wyjazdem do szpitala warto zadzwonić na salę porodową i zapytać o miejsce.

Katarzyna

ogrom świetnej wiedzy

Katarzyna

W którym tygodniu powinna się odbyć ostatnia wizyta u ginekologa?

W 40tyg ciąży

Jagoda czy pod koniec ciąży może pojawić się znikoma ilość erytrocytów w moczu?

Tak. Może to być objawem dojrzewającej się szyjki macicy do porodu. Warto to różnicować z infekcją w układzie moczowym.

Jagoda

czy dzwonić wcześniej do szpitala to dzwonić na izbę przyjęć czy bezpośrednio na porodówkę?

W zależności od informacji, które chcemy uzyskać możemy się kontaktować z salą porodową lub oddziałem położniczo- ginekologicznym.

Anna Czy w 39 tc ciąży dziecko może być bardziej aktywne?

Anna

Czy to już skurcze o których nie wiem?

Marta

czy w 37 tc mogę odczuwać słabiej ruchy dziecka??

Tak. Jest to związane z coraz mniejszą ilością miejsca w macicy. Nadal należy kontrolować ilość ruchów dziecka w ciągu doby.