

Magdalena

Czy podczas kontaktu skóra do skóry dziecko może być cały czas połączone z mamą pępowiną?

Tuż po porodzie tak:) Opóźnione odpięcie u donoszonego noworodka w dobrym stanie to około 2 minuty.

Kinga

Dlaczego zrezygnowano z suplementacji wit. K po wyjściu ze szpitala?

Ponieważ dawka 1 mg podana domięśniowo zabezpiecza przed wystąpieniem objawów choroby krwotocznej.

Paulina

Ile jednostek witaminy D powinno się podawać dzieciom od 6 lat?

DZIECI (1–10 LAT)

- u dzieci zdrowych przebywających na słońcu z odkrytymi przedramionami i podudziami przez co najmniej 15 min w godzinach od 10.00 do 15.00 bez kremów z filtrem w okresie od maja do września suplementacja nie jest konieczna, choć wciąż zalecana i bezpieczna
- jeżeli powyższe warunki nie są spełnione, zalecana jest suplementacja w dawce 600–1000 IU/dobę, w zależności od masy ciała i podaży witaminy D w diecie, przez cały rok

Patrycja

Czy można szczepić dziecko w drugiej dobie a nie pierwszej?

Można

Magdalena

Co Pani myśli o pobieraniu krwi pępowinowej?

Są różne zdania na ten temat. Jest to ogromna i bardzo pozytywna przyszłość medycyny, ale nadal wątpliwości budzi konieczność wcześniejszego odpięcia.

Polecam przeczytać → <https://www.mp.pl/pytania/pediatrica/najnowsze-pytania/192804,czy-przechowywac-w-banku-probke-krwi-pepowinowej>

Marcin

Witamina K podawana jest jednorazowo po urodzeniu

Tak – domięśniowo.

Anna

Czy po CC to tata może mieć kontakt skóra do skóry przez te 2 godzinki?

Może, ale aktualnie epidemia w tym przeszkadza. Zazwyczaj kontakt skóra do skóry może być krótszy i mama jak już wróci z cięcia cesarskiego może nakarmić Maleństwo.

Patrycja

Jak można zrobić badanie na SMA?

Są laboratoria, które wykonują badania.

LISTA dostępna tutaj → <https://www.fsma.pl/rdzeniowy-zanik-miesni/diagnoza/poradnie-genetyczne/>

Paulina

Czy witaminę K trzeba ciągle podawać?

Nie, jeśli została podana po urodzeniu domięśniowo.

Magdalena

Czy jeśli dziecko nie chce jeść z piersi, to można odciągać go za pomocą laktatora i mu podawać? Czy warto mieć swój laktator, czy szpital na Czarnowie bez problemu go udostępnia?

Można odciągnąć (ręcznie również – najlepiej w 1 dobie) i podawać:) Warto mieć swój laktator, ale w szpitalu na Czarnowie są laktatory udostępniane bez problemu:)

Patrycja

Jeśli jakieś województwo nie jest uwzględnione profilaktycznie do SMA to jak można to zrobić we własnym zakresie?

Lista ośrodków dostępna tutaj → LISTA dostępna tutaj → <https://www.fsma.pl/rdzeniowy-zanik-miesni/diagnoza/poradnie-genetyczne/>

Katarzyna

Od kiedy są prowadzone badania w kierunku SMA, gdzie można znaleźć listę szpitali gdzie są już przeprowadzane??

Po formalnej decyzji Ministra Zdrowia rozpocznie się wdrażanie programu. Zaczynając od województwa mazowieckiego, na przestrzeni 2021 i 2022 nowy test będzie wdrażany w kolejnych województwach. Od 2023, w nowej pięcioletniej edycji programu (2023–2027), SMA będzie figurowało po prostu jako standardowy test przeprowadzany u każdego noworodka.

Aktualna lista ośrodków dostępna tutaj → <https://www.fsma.pl/rdzeniowy-zanik-miesni/diagnoza/poradnie-genetyczne/>

Kasia

Czy badania przesiewowe na SMA we własnym zakresie z firmy MedGen są ok? czy warto zrobić je nawet w drugim miesiącu życia dziecka, czy trzeba było to robić od razu po porodzie?

Tak są ok:) **Aktualna lista ośrodków dostępna tutaj → <https://www.fsma.pl/rdzeniowy-zanik-miesni/diagnoza/poradnie-genetyczne/>**. Można oczywiście zrobić w drugim miesiącu życia.

Paulina

Co by Pani doradziła podawać dzieciom na biegunkę?

Wszystko zależy o jakiej etiologii i jaki wiek dziecka. Najważniejsza jest wizyta lekarska. Bardzo ważne jest zapobieganie odwodnieniu.

Marcin

Czy badanie na SMA można wykonać też już u 5 miesięcznego malucha?

Można:)

Magda

Kiedy po porodzie wykonywane są badania w kierunku SMA, gdzie można znaleźć listę szpitali gdzie są już przeprowadzane?? Czy to badanie dotyczy każdej porodówki czy tylko wybrane szpitale będą je wykonywać?

Po formalnej decyzji Ministra Zdrowia rozpocznie się wdrażanie programu. Zaczynając od województwa mazowieckiego, na przestrzeni 2021 i 2022 nowy test będzie wdrażany w kolejnych województwach. Od 2023, w nowej pięcioletniej edycji programu (2023–2027), SMA będzie figurowało po prostu jako standardowy test przeprowadzany u każdego noworodka po urodzeniu.

Aktualna lista ośrodków dostępna tutaj → <https://www.fsma.pl/rdzeniowy-zanik-miesni/diagnoza/poradnie-genetyczne/>

Magda

Pierwsze karmienie - jakie ilości pokarmu? ile w pierwszej dobie dziecko powinno dostać pokarmu? A ile w następnej dobie do powiedzmy pierwszego tygodnia? O ile powinno się te ilości zwiększać i kiedy będzie to stała ilość pokarmu?

Pierwsze karmienie to bardzo małe ilości pokarmu od 2 do 10 ml na karmienie. W pierwszych 10 dniach ilość pokarmu na porcję wyliczamy średnio wg wzoru: wielkość porcji (ml) = 10 x (dzień życia - 1) np. 8-dniowy noworodek powinien otrzymywać średnio ok. 70 ml na porcję - 10 x (8-1).