

Justyna

czy na każdym etapie laktacji można mieć zapalenie piersi? kp już 10 msc

Niestety tak. Co prawda znakomita większość zapaleń zdarza się w ciągu pierwszych tygodni porodu, ale później może się tak zdarzyć, że np. maluch w czasie zabawy uderzy w pierś i w wyniku tego powstanie stan zapalny.

Pozytywna informacja jest taka, że większość zapaleń piersi udaje się zwalczyć prawidłowym postępowaniem oraz lekami p/zapalnymi.

Ola

Czy lepiej przygotować się do karmienia jeszcze przed porodem?

Tak, zdecydowanie! Drogi pozyskiwania informacji mogą być różne - szkoła rodzenia, edukacja przedporodowa u położnej środowiskowej bądź spotkania z CDL.

Justyna

czy jak dziecko preferuje jedzenie z jednej piersi a druga odrzuca to ta druga przestanie wytwarzać mleko?

Jeśli nie będziemy jej stymulować np. laktatorem bądź aktywnie przystawiać malucha w innych pozycjach, to niestety tak. Wtedy ta jedna pierś przejmie funkcję drugiej i będzie produkować mleko za dwie, co spowoduje dużą dysproporcję piersi.

Monika

czy bielizna (staniki z usztywnieniem lub bez) ma jakiś wpływ na laktację?

Biustonosze z fiszbinami mogą zwiększać ryzyko zastoju. Fiszbina, która uciska pierś w jednym miejscu powoduje zaburzony przepływ pokarmu. Dlatego najlepiej nosić miękkie biustonosze.

Marta

Czy można przed porodem smarować brodawkę lanoliną w ramach przygotowania do laktacji? Jeśli tak, to od którego tygodnia ciąży?

Nie ma takiej potrzeby. Lanoliny używamy po porodzie do pielęgnacji piersi. Wtedy faktycznie łagodzi podrażnienia, powoduje szybsze gojenie ranek, jeśli się pojawiają.

AsiaW

Syn odkąd skończył 3 miesiące odrzuca piersi. Mleko odciągnięte pije. Interesuje go wszystko dookoła. Miejsce karmienia jest takie samo od samego początku. Co może być przyczyną? Z wędzidełkami wszystko dobrze...

Przyczyn może być wiele. Począwszy od problemów z pozycją, napięciem mięśniowym poprzez przyzwyczajenie do butelki, z której pokarm pobiera się dużo łatwiej. Najlepiej skonsultować się z CDL, wypróbować alternatywne metody podawania pokarmu.

EwaG

poród naturalny, wszystko idealnie (waga 3030), spadek wagi 7,9% w drugiej dobie.

EwaG

syn 3 tyg., prawie nie przybiera na wadze, nie odzyskał wagi urodzinowej.

Należy bardzo dokładnie przyjrzeć się karmieniu. Ilości karmień, efektywności pobierania pokarmu, ilości oddawanego moczu i stolca, sposobu przystawiania do piersi. Z pewnością maluch pobiera nieodpowiednią ilość mleka w czasie karmienia. Należałoby sprawdzić też jamę ustną dziecka, budowę piersi mamy. Tutaj jest bardzo dużo możliwych przyczyn, łącznie z infekcją np. układu moczowego.

Anna

czym szkodzi wyciskanie siary w ciąży?

Może to wywołać akcje porodową. Drażnienie brodawek sutkowych ciąży jest jedną z metod wywoływania skurczy.

EwaG

co może być przyczyna, że noworodek nie przybiera na wadze? poród naturalny, szybki, bez problemów, wędzidełko ok, dobrze łapie pierś i ssie. od tygodnia dokarmiam troszkę mm i on przybrał tylko 100 gram. Mleko w piersi jest.

Tutaj wyżej odpowiedziałam na praktycznie identyczne pytanie 😊

Ewelaa

kolektor pokarmu czy warto kupić i zabrać do szpitala?

Warto zakupić, tym bardziej, że koszt niewielki, a przydaje się bardzo. Ale dopiero od nawału pokarmu, więc nie trzeba brać do szpitala.

Monika

czy włókniaki i torbiele w piersi mogą utrudniać laktację?

Utrudniać nie, ale mogą predysponować do częstszych zastoju.

NATALKA

czy zamrażanie siary to dobry pomysł?

Bardzo dobry. Przydaje się po porodzie wcześniaków, dzieci, które nie mogą być przystawione po porodzie do piersi oraz dzieciom mam z cukrzycą.

AsiaW

Dodam, odnośnie syna 3 miesięcznego, że kiedy go przystawiam do piersi to jest krzyk, nie ma znaczenia która to pierś

EwaG

do kiedy dziecko jest nieodkładane? mój synek ma 23 dni i nadal chce być ciągle na piersi. co zasypia i chce go odłożyć to się budzi i płacze i znów na pierś

Zazwyczaj przyczyną takiej zupełnej nieodkładalności jest to, że maluch nie jest najedzony.

Natomiast jeśli dobrze przybiera na wadze, czyli najada się to ma po prostu dużą potrzebę bliskości, która jest naturalna do końca 3 miesiąca.

marek tata

Czy kiedy dziecko maceruje brodawkę przy jedzeniu to może to mieć związek z wędzidełkiem albo z napięciem mięśniowym?

Tak, oczywiście. Należy też przyjrzeć się technice przystawiania

Anetta

od kiedy wprowadzić butelkę z odciągniętym mlekiem żeby przyczaić dziecko do butelki w razie jakiegoś wyjścia mamy żeby nie było wtedy problemu

Po okresie nawału, czyli mniej więcej w 2 tygodniu. Aczkolwiek jeśli zrobimy to później, to tym lepiej dla laktacji. Nie ma takiego jednoznacznego terminu, w którym należałoby to zrobić.

EwaG

jak rozpoznać czy noworodek ma infekcję moczu? nie ma gorączki, ale jest bardzo śpiący, nie przybiera na wadze

Należy złapać mocz. Najlepiej do kubeczka, oczywiście po uprzednim dokładnym umyciu.

Aga Wroblewska

czy preparaty z siarą w proszku to dobre rozwiązanie dla maluszka?

Myślę, że to chwyt marketingowy.

EwaG

poleca Pani Femaltiker na pobudzenie laktacji? bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że działa...
Polecam Femaltiker lub kozieradkę . U większości dziewczyn działają super , ale zdarzają się takie ,
które nie widzą różnicy w ilości mleka.

Anetta

czy siarę można odciągnąć przed porodem w domu i zamrozić na wszelki wypadek? jak nie ma
typowych wskazań? czy to nie spowoduje że później po porodzie już nie będzie siary w piersiach jak
wcześniej odciągniemy.

Oczywiście, że można. Zamrażamy małe ilości - 1-2 ml . Siara produkuje się aż do nawału. Nie ma
możliwości, żeby odciągnąć "całą" siarę z piersi - to fabryka nie magazyn 😊😊😊