

Kasia

Na co zwrócić uwagę u noworodków chłopców jeśli chodzi o jądra?

Odp: W trakcie badania przedmiotowego oceniamy wygląd jąder, sprawdzamy czy znajdują się w mosznie, patrzymy czy są prawidłowej wielkości i mają odpowiednią konsystencję. Jeżeli coś nas zaniepokoi w trakcie badania zawsze warto wykonać badanie usg.

Magdalena

jak długo zarasta ciemiączko?

Odp: Ciemię przednie zazwyczaj do 18 miesiąca życia (od 10. do 18. mca życia), a ciemię tylne do około 3 miesiąca.

Agnieszka

Kiedy powinniśmy zgłosić się z dzieckiem do neanotologa?

Odp: Zawsze kiedy zaniepokoi nas stan noworodka. Do Poradni Neonatologicznej najczęściej kierowane są wcześniaki bądź dzieci donoszone, które miały różnego rodzaju problemy związane z procesami adaptacyjnymi w szpitalu. Najczęściej wizyty u neonatologa dotyczą: problemów związanych z wcześniactwem, brakiem przyrostu masy ciała, przedłużającą się żółtaczką, często zdarzają się porady laktacyjne.

Magdalena

jaka jest wielkość ciemiączka? czy może być nieprawidłowo duże?

Odp: zazwyczaj ciemiączko ma wymiary 2 x 2 cm do 3x 5 cm

Dominika

Czy w szpitalu po wypisie, otrzymam informację kiedy udać się z noworodkiem na kontrolę?

Czy odbywa się ona wtedy w szpitalu czy w przychodni?

Odp: Wszystko zależy indywidualnie od przebiegu pobytu noworodka w szpitalu. Jeżeli procesy adaptacyjne zachodziły prawidłowo to zazwyczaj wystarczy wizyta patronażowa położnej w domu. Jeżeli dzidzius wymaga kontroli u specjalisty wówczas dostaje skierowania do odpowiedniej poradni już na oddziale noworodkowym.

Kinga

Jak szybko mama dostaje dzidziusia po cc?

Odp: Wszystko zależy od warunków jakie panują na oddziale noworodkowym. Zazwyczaj dzieciątko może być przyniesione do mamy od razu po cięciu cesarskim:)

Natalia

ile powinna wzrastać waga noworodka?

Odp: Około 26-31 g na dobę przez pierwsze 3 miesiące życia:)

Anna

Kiedy najlepiej rozpocząć rozszerzanie diety?

Odp: Rozszerzanie diety u Małenstwa można rozpocząć jak tylko dziecko wykazuje umiejętności rozwojowe, zwykle po ukończeniu przez dziecko 17. tygodnia życia i nie później niż w 26. tygodniu życia. Powinno się stopniowo wprowadzać nowe pokarmy. Zachęcam gorąco do zapoznania się ze stroną www.1000dni.pl, na której można znaleźć wszystkie informacje, dotyczące żywienia małych dzieci:)

Natalia

Czy ulewianie u noworodka zawsze powinno nas zaniepokoić ?

Odp: Nie zawsze:) Jeżeli dzieciątko ma prawidłowy rozwój psychoruchowy, ładnie przybiera na wadze i nie prezentuje objawów alarmowych to znaczy, że nie powinno być powodu do obaw. Zapraszam do obejrzenia live'a o ulewaniach na moim profilu Neonatoolka z dnia → 28 maja 2020:)

Katarzyna

Jeżeli dziecko urodziło się "zageszczone" i przed wyjściem do domu nadal tak było to jak często należy kontrolować badania krwi i przez jaki długi okres?

Odp: Wszystko zależy od objawów i wyników morfologii Małeństwa. Lekarz z oddziału noworodkowego powinien dać odpowiednie zalecenia. W większości przypadków nie ma powodu do niepokoju, ale można spodziewać się na przykład przedłużonej żółtaczki.

Kamila

5 kg w 15 pierwszych tygodniach życia - czy to za dużo? skok z ok. 30 do 90 centyla..

Odp: Prawidłowy przyrost masy ciała to około 150-200 g na tydzień przez pierwsze 3 miesiące życia, co oznacza, że takie tempo jest za duże, ale trzeba zwrócić uwagę na to jak jest karmiony dzidzius (pokarm mamy czy mieszanka) i w jakiej ilości:) Oczywiście zaleciłabym badanie lekarskie, żeby sprawdzić czy wszystko jest w porządku w badaniu przedmiotowym:)

Weronika

Czy dietę rozszerzamy i dajemy - papki czy jednak bardziej skłaniamy się do metody BLW?

Odp: W przypadku rozszerzania diety jest bardzo duże pole do popisu. Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze stroną www.1000dni.pl:) Można tam znaleźć wszystkie najnowsze informacje, dotyczące rozszerzania diety – od konsystencji, po ilość posiłków. Jest również artykuł o metodzie BLW:) Wiele zależy od samego dzieciątka i jego gotowości do jedzenia posiłków:)

Agata

Jak często dzieciaczek powinien być badany przez pediatrę do 4 roku życia?

Odp: Wszystko zależy indywidualnie od Małeństwa. W książeczce zdrowia są wyznaczone terminy badań profilaktycznych. Najwięcej wizyt jest w pierwszym roku życia i często zbiegają się ze szczepieniami u Małeństwa. Do 1. roku życia, na bilans zdrowia (badanie profilaktyczne) zazwyczaj powinno się udać w okolicy 4. tygodnia życia dziecka, pomiędzy 3. a 6. oraz 9. a 12 miesiącem życia. Kolejne bilanse wykonuje się odpowiednio w wieku 2, 4, a idąc dalej w wieku 6, 10, 14 i 18 lat.

Kinga

Dlaczego dokarmia się noworodki bez wiedzy i zgody mamy? Czy jeśli będę mieć przy sobie oświadczenie, że nie wyrażam na to zgody, będzie to respektowane?

Odp. Na każde dokarmianie dzieciątka powinna zostać wyrażona zgoda mamy. Dokarmianie Małeństwa zawsze też powinno wynikać ze wskazań medycznych.

Agnieszka

Czy każde dziecko powinno ułać po jedzeniu?

Odp. Nie. Bardzo dużo Maluszków ulewa, ale nie wszystkie.

Agnieszka

Do kiedy należy odbijać dziecko po jedzeniu?

Odp: Wszystko zależy indywidualnie od Maleństwa.

Odbijanie jest zazwyczaj konieczne od urodzenia do ukończenia przez dzidziusia 6. miesiąca życia. Wiele zależy od samego dzidziusia i jego zwyczajów żywieniowych. W wieku 6 miesięcy zwykle rozszerza się dietę niemowlaka o pokarmy stałe, co przekłada się na mniejsze znaczenie gazów i odbijania w życiu dziecka.

Natalia

Do którego miesiąca życia dziecka szmerek na sercu może się wyciszyć ?

Odp: Wszystko zależy z czego wynika szmer nad serduszkami – czy jest niewinny czy wynika z wady – warto zawsze wykonać kontrolne echo serca. W wieku niemowlęcym i u starszych dzieci szmery są bardzo częste.

Katarzyna

dla czego maluszkom po porodzie wykonywane jest usg główki? usłyszałam odpowiedź, że dziecko jest "drobne" i należy wykonać

Odp: Jeżeli dzieciątko urodziło się za małe w stosunku do wieku płodowego (czyli jest hipotrofiem) należy się usg przezciężniczkowe, by sprawdzić jak wygląda ośrodkowy układ nerwowy. Takie badanie pozwala nam czasem określić przyczynę hipotrofii.

Katarzyna

Na co zwracać uwagę u dziecka "przenoszonego" ?

Odp: Dzidzius przenoszony, czyli urodzony po 42. tygodniu ciąży ma zwiększone ryzyko: niedotlenienia, dystocji barkowej, zespołu aspiracji smółki, urazów. Wynika to z mniejszej wydolności łożyska w ciąży trwającej zbyt długo.

Natalia

Jak duży spadek wagi w siatkach centylowych powinien nas zaniepokoić ?

Odp: Niepokojący jest spadek o 2 kanały centylowe, ale zawsze każdy spadek w siatkach powinien być szczegółowo przeanalizowany przez lekarza.

Magdalena

czy każde dziecko odbija po jedzeniu ??

Odp: Nie wszystkie dzieci odbijają po jedzeniu.

Agnieszka

U dziecka stwierdzo problemy z nerczką, spłylenie kielichów, jak czesto powinno się to schorzenie kontrolować?

Odp: Wszystko należy rozpatrywać indywidualnie w zależności od obrazu USG Maleństwa i jego stanu klinicznego. Lekarz po zbadaniu powinien dać odpowiednie zalecenia co do częstości badań kontrolnych.

Anna

Czy każde dziecko. Zostaje zaszczepione w pierwszej dobie?

Odp: W 1 dobie zazwyczaj wykonuje się szczepienie p/ko WZW t. B. Szczepienie przeciw gruźlicy można wykonać przed wypisem ze szpitala.

Magdalena

Pani Doktor, czy u noworodka można wykonać badanie w kierunku SMA?

Odp. Można, ale nie jest to badanie rutynowe. Badanie to najczęściej wykonuje się w przypadku niepokojących objawów u dziecka.

Agnieszka

Ciemniaczko pulsujące, czy to norma?

Odp: Wszystko zależy – lekkie pulsowanie nie powinno budzić obaw (może się zdarzyć podczas płaczu i wracać do pierwotnej formy gdy dziecko się uspokoi, takie pulsowanie może być również związane z silnymi emocjami, a nawet intensywnym ssaniem). Zawsze jeżeli są wątpliwości warto skorzystać z porady lekarskiej.