

Lillianna

Pierwsza córka miała żółtaczkę dostała w 4 dobie wyszliśmy ze szpitala. Ale z żółtaczką utrzymywali się długo, czy glukoza się zbija ja mądra tylko pierś podawałam czy nie uszkodziłam jej żadnych narządów?

Bardzo dobrze, że podawała Pani tylko pierś. Podawanie glukozy nie wpływa na obniżenie poziomu bilirubiny. Jeśli Pani Maluszek miałby bardzo wysoki poziom bilirubiny, który mógłby spowodować ewentualne uszkodzenia na pewno byłby wyłapany przez lekarza POZ i skierowany do szpitala celem rozszerzenia diagnostyki. Jeśli tak się nie stało wówczas podejrzewam, że poziom nie był na tyle wysoki, żeby mógł spowodować uszkodzenia u Pani Malucha.

Paula

Jaki poziom bilirubiny jest prawidłowy?

Norma dla osoby dorosłej to od 0,2 do 1.1 mg/dl. Natomiast ta norma nie dotyczy noworodków.

Agnieszka

Jak długo noworodek może zostać zatrzymany w szpitalu w przypadku cięższego przebiegu żółtaczki?

Nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, tak długo jak będzie wymagał tego jego stan zdrowia.

Marta

z jakim wynikiem bilirubiny można wypisać maluszka do domku?

Jeśli nie ma innych objawów, maluszek chętnie je, przybiera na wadze to nawet z bilirubiną ok. 10 mg/dl, ale to wszystko zależy od stanu dziecka.

Karolina

Czy wcześniactwo ma wpływ na przedłużającą się żółtaczkę?

Ma wpływa, u wcześniaków procesy wydalania bilirubiny są na tyle nie rozwinięte, że to może to wpływać na przedłużanie się żółtaczki.

Paula

Kiedy pojawia się żółtaczką u noworodka urodzonego o czasie wcześniaka i kiedy powinna ustąpić?

Zależy o jakiej żółtaczce mówimy, żółtaczką fizjologiczną pojawia się w 2-3 dobie życia i u noworodków donoszonych trwa do ok 7-10 doby, a u wcześniaków do 14 dni.

Agnieszka

Jedli tata ma zespół Gilberta, to czy noworodek może mieć większe prawdopodobieństwo przejścia żółtaczki w cięższy sposób?

Nie koniecznie, natomiast jest większe ryzyko wystąpienia tego zespołu u dziecka w przyszłości.

Agnieszka

Czy nacięcie krocza jest zawsze w znieczuleniu?

Nie zawsze, najczęściej wykonywane jest w czasie skurczu. Znieczulenie podawane jest przy szyciu krocza po nacięciu.

Marta

Czy jeśli poziom bilirubiny wzrośnie w domu to trzeba wrócić do szpitala czy można wypożyczyć lampy do naświetlania i używać ich w domu? czy jest to bezpieczne?

Wszystko zależy od stanu dziecka, jeśli jest możliwość naświetlania w domu to można to robić, ale po wykluczeniu, że jest to tylko żółtaczka, po wykluczeniu infekcji czy chorób mogących tą żółtaczkę wywołać.

Marta

Jakie są metody radzenia sobie z obniżeniem bilirubiny?

Ze strony mamy to częste przystawianie do piersi, prawidłowe efektywne karmienie. Z leczenia to fototerapia.

Lillianna

Czy to złe że dziecko ma żółtaczkę czy lepiej na przyszłość ze miał czy nie?

Nie ma to znaczenia.

Monika

Ile czasu może utrzymywać się taka żółtaczka fizjologiczna i co może nas zaniepokoić ? u synka w 37 tyg pamiętam że trwała dość długo.

Żółtaczka fizjologiczna u noworodków donoszonych z reguły utrzymuje się do 7-10 dni, u wcześniaków do 14, żółtaczka związana z karmieniem piersią typu późnego może utrzymywać się nawet do 12 tygodni. Zaniepokoić powinna Nas zmiana zachowania dziecka, nadmierna ospałość lub nadmierne czuwanie, brak przyrostów masy ciała, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, gorączka, przenikliwy płacz.

Agnieszka

Czy w czasie pandemii mama może być z dzieckiem, które musi być naświetlane, gdy sama już zostaje wypisana ze szpitala po porodzie?

Nie wiem jak to wygląda w innych szpitalach u Nas Mama jest z Dzieckiem na cały czas trwania hospitalizacji.

Paula

Czy żółtaczką może pojawić się później? niż w drugiej dobie życia jedli się pojawi to udać się do pediatry?

Może, jeśli tak się stanie zawsze należy skonsultować się z lekarzem.

Maria

Czy jedli matka miała żółtaczkę to dziecko ma większe ryzyko zachorowania?

Nie.

Paula

Czy możemy wdrożyć jakąś profilaktykę by zapobiec żółtaczce fizjologicznej?

Kontrola karmień, prawidłowy pasaż, czyli częste i efektywne karmienia.

Marta

Czy częste kp pomaga w zakończeniu żółtaczki fizjologicznej?

Tak jak najbardziej, zmniejsza zwrotny wychwyt bilirubiny z jelit ze względu na prawidłowy pasaż.

Agnieszka

Czy mama w ciąży ma zazwyczaj podwyższony poziom bilirubiny w swoim organizmie, skoro jej wątroba "przetwarza" bilirubinę jej samej i dziecka?
Nie, normy są tak dobrane, że uwzględniają ten wychwyt.

Karolina

Od jakiego stężenia bilirubiny naświetla się dziecko?
Jeśli jest to tylko podwyższony poziom to >15 mg/dl.

Milena

Czy jedli pierwsze dziecko nie miało żółtaczki, to czy drugie raczej też nie Bedzie miało?
Trudno powiedzieć, może mieć, ale nie musi.

Agnieszka

Czy mama siedząca przy dziecku, które jest naświetlane, również powinna mieć okulary ochronne?
Nie, nie ma takiej konieczności, chyba że byłaby narażona na bezpośrednie działanie lamp na oczy. Ale o to trudno bo lampy są od góry to musiałyby zaglądać od spodu, a co do mat do naświetlania to jest zachowany dystans także nie ma takiej konieczności.

Karolina

Czy to prawda czy mit że żółtaczkę można "zbijać" poprzez wystawianie dziecka na promienie słoneczne (oczywiście nie nadmiernie intensywne) 😊
Raczej mit, inna długość światła.

Katarzyna

Na jakiej zasadzie działa urządzenie do pomiaru bilirubiny ?
Bilirubina absorbuje światło z lampy przez co ulega przekształceniu do formy, która jest łatwiej usuwana z organizmu.