

Odpowiedzi na pytania ze spotkania „Świadoma Mama” z dnia 10.02.2022
Dr Anna Ptaszyńska

Paulina

Gdzie można sprawdzić jaki szpital ma dany stopień referencyjności?

Na stronie NFZ lub tel. Infolinia 800-190-590.

Paulina

Czy szpitale mama obowiązkiem sprawdzić wędzidełko? nie kojarzę żeby u starszej córki było ono sprawdzane

Wędzidełko ocenia lekarz podczas rutynowego badania pediatrycznego oraz położna przy ocenie laktacji. Najwidoczniej Pani córka nie prezentowała żadnych kłopotów z karmieniem i stąd temat wędzidelka nie był eksponowany.

Paulina

Jak radzić sobie z żółtaczką, która nasila się po powrocie do domu?

Jedynym profilaktycznym działaniem jest kontrola karmienia, należy dopilnować aby dziecko często było przystawiane do piersi, nie robiło zbyt długich przerw na sen, i tym samym było odpowiednio nawodnione. Przez pierwszych kilka dni po wyjściu ze szpitala, żółtaczka może jeszcze narastać, ale w ocenie jej nasilenia powinna pomóc Położna podczas patronażu.

Donia

Jaki stopień referencyjności trzeba wybrać gdy matka ma wirus wzw typu B i cukrzycę ciążową (bez insuliny)?

Odpowiedni będzie II-gi stopień referencyjności.

Martyna

Obecnie jestem w 32 tygodniu ciąży i mam stwierdzoną cukrzycę, czy również na tym etapie ciąży powinnam w razie pojawienia się niepokojących objawów zgłosić się do szpitala o 3 stopniu referencyjności?

Oczywiście, że w razie niepokojących objawów powinna Pani zgłosić się do lekarza, który może Panią dalej skierować do szpitala. Może to być szpital z 3- lub 2- stopniem referencji, wybór zależy od Pani i od Pani lekarza prowadzącego. Kobieta po 32 tygodniu ciąży i z cukrzycą, bez innych czynników ryzyka, może rodzić w 2-go stopniowym szpitalu.

Paulina

Czy w Salve przeprowadza się rutynowo test w kierunku SMA?

Tak w Salve (jak i w większości szpitali w Polsce obecnie) wykonuje się test w kierunku SMA w ramach przesiewowych badań profilaktycznych.

Beata

Czy dzieci są badane w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni?

Tak, mają wykonany z krwi przesiewowy test w kierunku SMA.

Monika

Czy opieka w szpitalu neonatologiczna należy się każdemu dziecku?

Opieką neonatologiczną otoczony jest każdy noworodek, ale jej zakres zależy od stanu dziecka.

Paulina

Czy możemy wybrać sobie neonatologa?

Neonatolodzy pracują w systemie dyżurowym, wg ustalonego wcześniej na dany miesiąc grafiku. Nie ma możliwości indywidualnego wyboru.

Anetta

Czy po urodzeniu jest zalecane wykonanie usg bioderek i jamy brzusznej dziecka? jest to refundowane?

Badanie stawów biodrowych należy do profilaktycznych badań przesiewowych w kierunku wrodzonej dysplazji stawów biodrowych i jest refundowane przez NFZ. Jest wykonywane po pierwszym miesiącu życia, i powinien skierować na to badanie pediatra POZ.

Marta

Czy badania przesiewowe obejmują już SMA?

Tak, badanie przesiewowe wykonywane z kropli krwi na bibułę, obejmuje obecnie też diagnostykę SMA.

Martyna

Jak wygląda opieka po poradzie na słodką mamą (cukrzyca) ? 😊

Mama „cukrzycowa” ma dodatkowo po porodzie kontrolowana glikemia i specjalną dietę.

Martyna

Kiedy wykonuje się szczepienie na gruźlicę ? w której dobie po porodzie ?

W naszym szpitalu szczepienie BCG przeciwko gruźlicy wykonujemy u noworodka przed wypisem, po przeprowadzonym 2-dniowym okresie obserwacji. W niektórych przypadkach po wykonaniu dodatkowych badań laboratoryjnych.

Paulina

Co z dzieckiem które urodzi się w35tc a waży powyżej 2,5kg? czy zostaje z matką czy jest przenoszony na oddział neonatologii?

To zależy od jego stanu ogólnego, czy nie prezentuje problemów z oddychaniem, z karmieniem, z żółtaczką. Może również pozostać z mamą w roomingu jeśli nic niepokojącego się nie dzieje.

Martyna

Czy podaje się mamie z podejrzeniem przedwczesnego porodu sterydy które mają na celu przyspieszyć rozwój płuczek ?

Tak, w przypadku rozpoczętego porodu przedwczesnego lub wystąpienia objawów zagrażających podaje się mamie sterydy (Celeston lub Dexaven)

Emilia

Czy po porodzie sprawdzone zostanie dziecko na naszą prośbę wędzidełko? ostatnio popularny temat 😊

Tak, ocenia się wędzidełko u noworodka rutynowo podczas badania pediatrycznego i przez położną laktacyjną.

Natka

Czy wysokie skorygowane ryzyko przedwczesnego porodu przed 34 tygodniem ciąży i zahamowanie wzrastania płodu przed 37 tygodniem ciąży (badania prenatalne I trymestru) oznaczają duże prawdopodobieństwo urodzenia wcześniaka? Czy jest większa szansa stracy ciąży?

Tak, nadciśnienie tętnicze w ciąży oraz zahamowanie wzrastania płodu są czynnikami ryzyka zakończenia porodu przed terminem. Dużo zależy od okresu ciąży, w którym te problemy pojawiają się i czy postępują. Na pewno jest to powód do częstych kontroli i wnikliwego monitorowania stanu ciąży u lekarza prowadzącego.

Dominika

Co z krótkim wędzidełkiem warto podcinać?

Moim zdaniem sam wygląd wędzidełka nie jest wskazaniem do jego podcinania. Decydować o tym można dopiero po okresie obserwacji karmienia i podjętych próbach „rozćwiczenia” wędzidełka oraz po konsultacji z położną laktacyjną, czy logopedą. Źle wykonany zabieg, brak późniejszych ćwiczeń i wytworzenie blizny, może skutkować powikłaniami w wieku późniejszym.

Dominika

Czy noworodkom wykonuje się rutynowo badania przesiewowe w kierunku SMA?

Tak, od zeszłego roku noworodki w większości województw w Polsce mają wykonany z krwi przesiewowy test w kierunku SMA.

Emilia

Dowiedziałam się, że przy cukrzycy ciążowej maluchowi będzie sprawdzany kilka razy dziennie poziom glukozy. Czy dzieje się to na oddziale położniczym czy na neonatologii?

W przypadku mamy z cukrzycą, wykonuje się u jej noworodka w pierwszej dobie życia kilka pomiarów glikemii. Dzieje się to na oddziale Położniczym. Na Neonatologię trafia

noworodek tylko w sytuacji kiedy ma hipoglikemię i konieczne jest podanie dożylnego wlewu glukozy.

Kasia

Jakie dodatkowe badania wykonuje się dziecku, którego mama miała cukrzycę ciążową?

U noworodka mamy z cukrzycą na Insulinie wykonuje się następujące badania: glikemia, morfologia, jonogram USG przeziemieniowe i jamy brzusznej oraz ECHO serca.

Ewa

Czy jeśli po urodzeniu dziecka robiono badanie SMA, można je wykonać później?

Myślę, że można to badanie wykonać w poradni POZ. Chociaż jest teraz w pakiecie badań przesiewowych pobieranych po urodzeniu, więc nie ma możliwości żeby było nie pobrane. Chyba, że matka nie wyraziła zgody.