

Agnieszka

Lepiej podawać dziecku szczepionki skojarzone czy pojedyncze? Oczywiście nie patrzymy tu na ilość ukuć.

Skuteczność w uzyskaniu odporności jest taka sama, po skojarzonych jest mniej NOPów, dlatego jeśli budżet domowy pozwala, warto kupić skojarzone.

Agnieszka

Jeśli dziecko zostało zaszczepione w szpitalu szczepinoką na WZW B Euvax, to czy później również powinno przyjmować tę szczepionkę czy warto zmienić na inną np. Engerix?

Nie ma takiej potrzeby.

Katarzyna

Jakie szczepienia dodatkowe Pan zaleca? Meningokoki, pneumokoki? Dodam, że dziecko będzie chodziło do żłobka

Tak jak starałem się to powiedzieć, najpierw warto kupić meningokoki. Pneumokoki są w „pakiecie na NFZ”. W dalszej kolejności rotawirusy, ospa i grypa. Jak budżet pozwoli, to wtedy pneumokoki „te płatne” (na 13 typów).

Katarzyna

Na które meningokoki lepiej zaszczepić? Typu B czy C?

W Polsce więcej jest zachorowań wywołanych typem B, więc jeżeli musi Pani wybrać, to proszę wybrać B. Najlepiej kupić obie, a właściwie to nie samo C, tylko ACW-135Y. Koszt jest niewielki w porównaniu do B.

Agnieszka

Czy szczepionki powinny być podawane zawsze w terminie i co jeśli on zostaną przesunięte? W związku z sytuacją epidemiologiczną niektóre przychodnie odraczają terminy szczepień i nie wiem czy to wpłynie na reakcję dziecka na szczepienie.

Nie muszą być zawsze, ale warto się trzymać ogólnego schematu. Przesuwanie szczepień może spowodować, że się o nich zapomni, albo dziecko zachoruje. Natomiast nie można skracać odstępów między szczepieniami (tzn. przychodzić wcześniej, niż wg planu).

Weronika

Czym się różnią szczepionki refundowane od tych 5 i 6w1

W refundowanych mamy błonica-tężec-krztusiec, polio, Haemophilus influenzae typu b i WZW B, czyli 6 chorób, z 3 oddzielnych iniekcji powtarzanych kilka razy. Szczepionka 5w1 to połączenie pierwszych 5 z tej listy, a 6w1 to połączenie wszystkich 6. Poza tym, w szczepionce 5w1 i 6w1 jest inna wersja szczepionki na krztusiec, która daje mniej odczynów i jest lepiej tolerowana przez dzieci.

Aleksandra

Czy warto szczepić dziecko od razu po porodzie, czy jednak warto odczekać np. 2 tygodnie?

Warto szczepić, nie ma powodu żeby czekać. Szczepienie przeciwko gruźlicy najłatwiej jest zrealizować właśnie po porodzie, bo później takie szczepienie u lekarza rodzinnego trudno jest

zorganizować, czasami czeka się nawet rok. Poza tym szczepienie przeciwko gruźlicy jest trudniejsze technicznie, a pielęgniarki z oddziału w szpitalu mają już dużą wprawę.

Katarzyna

Jaki musi być okres pomiędzy szczepieniami? U mnie w przychodni zawsze jest co 6 tygodni, ale ostatnio słyszałam, że może być 4 tygodnie. Czy okres pomiędzy szczepionką żywą a zabita różni się?

Dwie szczepionki żywe – albo razem na jednej wizycie, albo minimum 4 tygodnie odstępu. Żywa-zabita i zabita-zabita – dowolny odstęp. Natomiast nie ma sensu na dwa oddzielne szczepienia przychodzić dzień po dniu. Najlepiej podać 3-4 szczepionki na jednej wizycie i z głowy. Bez ryzyka, że w poradni nie będzie wolnych terminów, czy że szczepienie się opóźni bo dziecko zachoruje.

Mary

czy lepiej podać witaminę K dożylnie czy doustnie?

Domięśniowo.

Anna

Moja przychodnia odracza teraz szczepienia ze względu na pandemię, czy te szczepienia w późniejszym czasie będą bezpieczne dla dziecka?

Przychodnia nie powinna odraczać szczepień ze względu na pandemię. Powinny być realizowane zgodnie z planem. Opóźnienie szczepienia dziecka nie spowoduje, że szczepienie będzie bardziej szkodliwe, tylko wydłuży czas, kiedy dziecko nie będzie odpowiednio chronione.

Natalia

jakie powinny być odstępy między szczepieniami?

Dwie szczepionki żywe – albo razem na jednej wizycie, albo minimum 4 tygodnie odstępu. Żywa-zabita i zabita-zabita – dowolny odstęp. Natomiast nie ma sensu na dwa oddzielne szczepienia przychodzić dzień po dniu. Najlepiej podać 3-4 szczepionki na jednej wizycie i z głowy. Bez ryzyka, że w poradni nie będzie wolnych terminów, czy że szczepienie się opóźni bo dziecko zachoruje.

Katarzyna

Warto zaszczepić dziecko na grype?

Tak!

Natalia

jeśli chodzi o szczepienie na meningokoki, kiedy je robić?

Najlepiej jak tylko pozwala na to producent szczepionki, czyli meningokoki typu B od 9 tygodnia życia, a typy ACW-135Y od 7 tygodnia.

Katarzyna

W obecnych czasach naukowcy pracują nad szczepionką na covid-19 Czy jak już będzie dostępna to zaszczepić dziecko?

Nie wiadomo, kiedy będzie dostępna i dla kogo. Możliwe, że na szczepionkę poczekamy jeszcze rok i najpierw będzie dostępna tylko dla wybranych grup ryzyka (seniorzy, pracownicy szpitali). Na razie nie można odpowiedzieć na te pytanie.

Agnieszka

Czy szczepionka na pneumokoki powinna być podana w tym samym dniu z szczepionką w 5w1 lub 6w1. Czy lepiej podać ją w innym terminie.

Obie szczepionki można śmiało podać na jednej wizycie, nie ma powodu by sztucznie robić jakiś odstęp.

Ewelina F

Czy istnieje takie porównanie/zestawienie prawdopodobieństwa zachorowania na daną chorobę (jeśli nie szczepimy) z prawdopodobieństwem wystąpienia różnych NOPów po podaniu szczepionki na daną chorobę? Wtedy można by było podjąć świadomą decyzję znając ryzyko i prawdopodobieństwo zachorowania na daną chorobę z ryzykiem wystąpienia NOP. i czy istnieją jakieś korzyści z przechorowania choroby

Nie ma żadnych korzyści z przechorowania choroby zakaźnej.

Takiego zestawienia nie da się utworzyć. NOP NOPowi nie jest równy. Przebieg zakażeń też jest różny. Można spojrzeć na to inaczej: po wprowadzeniu szczepień przeciwko Haemophilus influenzae b zniknęły ropne zapalenia opon wywołane przez tę bakterię (i głuchota jako powikłanie), a w ich miejsce nie pojawili się pacjenci z NOPami. Tak samo z polio – ani jednego przypadku od wielu lat i brak nowych pacjentów w szpitalu z problemem po szczepieniu. Same spojrzenie na częstość choroby, czy ryzyka jakiegoś NOP nic nie mówi. Gdyby spojrzeć na np. najpoważniejszy NOP, czyli reakcje anafilaktyczne po szczepieniach, to jest to 1-2 przypadki na milion dawek szczepionki. Anafilaksję potrafimy skutecznie leczyć i pacjenci wracają do pełnego zdrowia (jeśli w porę otrzymają adrenalinę). Zgonów po szczepieniach jest jeszcze mniej. Natomiast z powodu meningokoków w 2016 roku zmarło dwoje niemowląt, a urodziło się 382 tys, czyli mamy 5 zgonów z powodu meningokoków na 1 milion niemowląt. Oprócz tego meningokoki zabiły kilkoro starszych dzieci, a łącznie zachorowało kilkadziesiąt osób. Czy to wystarczająco dużo, by przebić ryzyko NOP po szczepieniu? Wg mnie tak.

Agnieszka

Czy można zaszczepić dziecko po drugim roku życia przeciwko pneumokokom (jeśli nie było szczepione) i zastosować tylko jedną dawkę ?

Synflorix – 2 dawki tylko dla dzieci w wieku 2-5 lat

Prevenar 13 – jedna dawka po drugim roku życia

Natalia

jakie sa najczestsze NOPy

Ból w miejscu iniekcji, lokalny obrzęk, stan podgorączkowy, gorączka, czasem płacz lub senność.

Natalia

Pierwsze dziecko szczepiłam przeciw pneumokokom płatną szczepionką (13 typów). Czy obecnie gdy na 10 typów jest refundowana warto dopłacać za te dodatkowe 3 typy?

Najpierw radzę zaplanować meningokoki, rotawirusy, ospę i grypę. Jak w budżecie wystarczy pieniędzy, to wtedy wymiana pneumokoków z 10 na 13.