

Aneta Mama

witam 😊 mam 36 lat. badanie prenatalne (krew) wykazało duże prawdopodobieństwo choroby dziecka. Zdecydowałam się na badanie amniopunkcji, które wykazało wynik prawidłowy. czy 3 badanie prenatalne (nier refundowane przez NFZ) trzeba wykonać, czy już nie trzeba?

- niezależnie od prawidłowego kariotypu i wcześniejszych wyników, wciąż polecam wykonanie usg III trymestru z uwagi na to, że niektóre wady strukturalne są widoczne dopiero w III trymestrze. Pobrany materiał podczas amniopunkcji jest badaniem kariotypu w kierunku konkretnych podstawowych zaburzeń chromosomowych, a nie każdej choroby jaka może wystąpić. Do tego celu służą inne, dodatkowo płatne badania, jeśli mamy podejrzenie rzadszej choroby lub zespołu. A wady anatomiczne, które możemy zobaczyć dopiero w III trymestrze najczęściej nie są związane z żadną wadą genetyczną, niemniej jednak mogą wymagać porodu w ośrodku referencyjnym, czy wcześniejszej konsultacji np. kardiologa płodowego.

Kaka

Czy jeśli mam termin inny z okresu a inny z usg prenatalnego to kiedy mam się zgłosić do szpitala jeśli akcja się nie zacznie?

-Według rekomendacji PTGiP termin porodu z USG w I trymestrze jest referencyjny.

Magdalena

Czy badania prenatalne są refundowane z nfz dla kobiet w każdym wieku?

-niestety tylko po 35 roku życia, lub kiedy urodziłyśmy dziecko z wadą genetyczną, jeśli u nas/ojca dziecka stwierdzono aberracje chromosomalne lub USG I trymestru lub badanie biochemiczne wykazało nieprawidłowości. Są to warunki Programu Badan Prenatalnych NFZ.

Magda

Jakie badania dodatkowe powinna zrobić kobieta po 35 roku życia?

- nie ma wyszczególnionych żadnych dodatkowych badań po 35rż, ale z uwagi na wyższe startystycznie ryzyko wad genetycznych zdecydowanie powinna wykonać badania usg rozszerzone w każdym trymestrze

Kaka

Czy data porodu z badania Orientalnego jest ważniejsza niż ta z ostatniej miesiączki?

- data porodu z badania między 8-12 tyg ciąży jest dokładniejsza niż z miesiączki

Aneta

Czy jeśli amniopunkcja wykazała, że płeć jest męska, to czy to jest pewne na 100%

- Właściwie tak

Kaka

A jeśli data z usg 2 lub 3 trymestru jest znowu inna niż ta z usg 1? która jest ważniejsza i dlaczego?

-dziecko w I trymestrze przyrasta zawsze tak samo, później tempo wzrostu jest uzależnione od naszych genów, dlatego najważniejszy jest termin porodu wg USG z I trymestru

Sefi

Tylko właśnie nie rozumiem dlaczego błędy badań krwi często (na forach około 80% kobiet) ma ryzyko wystąpienia jakieś choroby a podczas porodu dziecko rodzi się zdrowe skąd takie rozbieżności w wynikach badań ?

-Badanie PAPPA i beta HCG u około 5% kobiet daje wyniki fałszywie dodatnie. Służy ono wykryciu nieprawidłowości u kobiet u których samo USG jest prawidłowe. USG razem z testem PAPPa ma czułość ok 95%. Sam test pokazuje nam funkcjonowanie łożyska, które często jest zaburzone właśnie w wadach genetycznych. Nie świadczy o chorobie dziecka, i jest tylko testem przesiewowym mającym wyłonić grupę która powinna być skierowana do dalszej diagnostyki.

Ania

Czy są jakieś wskazania do wykonania testu pappi jeśli kobieta nie ma jeszcze 35 lat?

- każda ciężarna powinna wykonać test pappi do usg I trymestru. Warunki refundacji są określone w Programie Badan Prenatalnych nfz.

Ania

W którym tygodniu najlepiej wykonać test pappi

- najlepiej już w 10 tygodniu, zwykle tydzień przed badaniem USG I trymestru

Magda

Czy ginekolog patrzy na wiek płodu po miesiączce czy po usg? Co jeżeli różni się o dwa tygodnie?

-data porodu z badania między 8-12 tyg ciąży jest dokładniejsza niż z miesiączki, to ona powinna być brana pod uwagę podczas reszty ciąży. Nazywamy to skorygowanym wiekiem ciążowym.

karolina

Co oznacza ryzyko 1:439 określające zahamowanie wzrostu płodu przed 37 tygodniem ciąży?

- to wynik z testu pappi szacujący jakie jest ryzyko masy ciała płodu poniżej 5 percentyla w 37 tyg. Taki wynik nie jest powodem do zmartwień, bo na masę ciała dziecka składa się bardzo wiele czynników.

Magda

Czy warto chodzić prywatnie do ginekologa i robić co miesiąc usg?

- według ustawy powinniśmy mieć przynajmniej 3 razy zrobione usg w ciąży, ale jeśli mamy możliwość wizyt co miesiąc na nfz z rzetelnym badaniem usg, a w 3 trymestrze wizyty odbywają się nawet częściej to nie ma potrzeby chodzić prywatnie. Niemniej jednak warto dobrze wybrać swojego lekarza prowadzącego, który ma aktualną wiedzę i do którego mamy zaufanie.

Sefi

A jeżeli 2 badania są w normie wówczas 3 nie musimy przechodzić ?

- absolutnie nie, w III trymestrze dopiero można zobaczyć wady anatomiczne, które mogą wymagać porodu w ośrodku referencyjnym, korekty po porodzie czy wcześniejszej konsultacji np. kardiologa płodowego.

Aneta

Czy w jakich przypadkach szczególnych 3 badanie prenatalne jest refundowane przez nfz? czy zawsze jest płatne?

-Niestety badanie III trymestru nie jest refundowane:(

Ania mama

Wiek płodu gdy różnica jest np ok 10 dni między usg a ostatnia miesiączka jak określić

- jeśli mowa o wieku z usg I trymestru to według niego powinna być skorygowana data porodu. Późniejsze USG nie zmieniają terminu porodu.

Aneta

Czy jeśli podczas 2 badania prenatalnego lekarz powiedział, że dziecko ma duży, zadarty nosek, to czy to jest pewne? czy nie może tego określić a był to tylko żart z jego strony?

- na dobrej jakości sprężenie USG możemy bardzo ładnie uwidocznić twarz dziecka, również w 3D. Choć nie ma takiego medycznego terminu i jest to też rzecz gustu to ręczę że lekarz sobie tego całkiem nie zmyślił.

Ilona

Czy test Nifty lub Panorama może zastąpić amniopunkcję?

- niestety nie, każdy nieprawidłowy wynik w testach wolnego płodowego DNA i tak trzeba potwierdzić amniopunkcją.

Olga

Czy do badania krwi podczas badań nieinwazyjnego należy być na czczo?

-na szczęście nie!

Klaudia

28-32 tyg. mamy na myśli skończony 32 tydzień?

- tu nie ma sztywnych ram czasowych, może być już ukończony 32 tydzień.

Aneta

Czy w przypadku gdy amniopunkcja wykazała, że jest zdrowe dziecko to czy mogę się jeszcze czegoś obawiać?

- podczas amniopunkcji pobierany jest płyn do podstawowego badania kariotypu płodu, aberracji liczbowych, najczęstszych trisomii i określana jest płeć. Jest mnóstwo zespołów mikrodelecji, chorób metabolicznych, które nie są rutynowo badane, musimy mieć wskazania żeby je wykonać. Poza chorobami uwarunkowanymi genetycznie jest mnóstwo innych wad które mogą wystąpić, dlatego powinno się wykonać USG rozszerzone II i III trymestru, aby je wykluczyć. Żadne badanie diagnostyczne nie daje 100% pewności.

Kaka

A jeśli na pierwszym usg jest ok to na drugim może jednak się okazać że nie?

- oczywiście, każde USG rozszerzone ma celu wykrycie innych nieprawidłowości, są wady które pojawiają się dopiero w II lub III trymestrze.

Eстера

Czy USG III trymestru jest refundowane czy tylko w wyjątkowych sytuacjach ?

-Niestety badanie III trymestru nie jest refundowane:(

Aneta

Czy jakieś choroby, nieprawidłowości mogą wystąpić dopiero w 3 badaniu prenatalnym?
-Tak, niektóre wady serca, układu pokarmowego czy moczowego, kończyn, małogłowie, niedorozwój mózdzku i wiele innych są widoczne dopiero w USG III trymestru.

Estera

Jk nterpretować następujące wyniki: trisomia 21: 1 do 1538 (ryzyko skorygowana), 1 do 770 (ryzyko podstawowe) trisomia 18: 1 do 17783 (ryzyko skorygowany), 1 do 2005 (ryzyko podstawowe), trisomia 13 : 1 do 6252 (ryzyko podstawowe), 1 do 13152 (ryzyko skorygowane)

- wszystkie ryzyka są niskie, patrzymy na ryzyko skorygowane badaniami biochemicznymi,

Ilona

W którym tygodniu najlepiej wykonać echo serca płodu?

- to zależy od wskazań do badania. Najcięższe wady serca można wykluczyć już w 12 tygodniu podczas badania prenatalnego. Echo serca może być wykonane zarówno w II jak i III trymestrze, bo niektóre wady widoczne są dopiero w późniejszym czasie.

MamaJulka

Czy otyłość może prowadzić do wad płodu lub wpłynąć na przedwczesny poród?

- do samych wad płodu nie, ale utrudniona diagnostyka USG może nie wykryć niektórych wad. Otyłość jest istotnym czynnikiem ryzyka porodu przedwczesnego.

anwro

Na 2 prenatalnych wyszło, że dziecko ma torbiel na głowie. Skąd się to bierze i czy w jakiś sposób zagraża?

- niestety potrzebowałabym więcej danych, najczęściej zdarza się torbiel spłotu naczyniowego, która jest łagodną, samoistnie znikającą zmianą. Ciężko stwierdzić skąd się bierze.

Aneta

Czemu te badania są takie drogie? 3 badanie prenatalne w Łodzi to koszt ponad 400 zł.

- to rozszerzone badanie USG, które bada wszystkie struktury anatomiczne, przepływy i rozwój płodu, aby je wykonywać potrzeba wielu lat praktyki i wielu również bardzo drogich kursów. Trwa ono też dłużej niż zwykle rutynowe USG. Stąd też ta cena.