

IMPFUNGEN	Säuglinge				Kleinkinder		Kinder		Jugendliche			Erwachsene		
	6 Wochen	2 Monate	3 Monate	4 Monate	11 – 14 Mo	15 – 23 Mo	2 – 4 J.	5 – 6 J.	7 – 8 J.	9 – 14 J.	15 – 16 J.	17 J.	ab 18 J.	ab 60 J.
Tetanus		G1	G2	G3	G4	N		A1		A2			A (alle 10 Jahre)	
Diphtherie						N		A1		A2			A (alle 10 Jahre)	
Pertussis (Keuchhusten)		6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	6-fach-Impfung	N		A1		A2			A <sup>d</sup>	
Poliomyelitis (Kinderlähmung)						N				A			ggf. N	
Hib (Haemophilus influenzae Typ b)						N								
Hepatitis B						N								
Pneumokokken <sup>a</sup>		G1		G2	G3	N								S
Meningokokken (Serogruppe C)					G (ab 12 Monaten)		N							
Rotaviren <sup>b</sup>	G1	G2	(G3)											
Mumps					G1 <sup>c</sup>	G2 <sup>c</sup>	N							
Masern							N							S <sup>e</sup>
Röteln							N							
Varizellen (Windpocken)					G1	G2	N							
HPV (Humane Papillomaviren)										G1 + G2 <sup>f</sup>	N			
Influenza (Grippe) <sup>g</sup>														S (jährlich)

**U** Vorsorgeuntersuchungen für Kinder und Jugendliche

**T** Schluckimpfung

**L** Lebendimpfung:  
Sind mehrere Lebendimpfungen erforderlich, entweder gleichzeitig oder mit Mindestabstand von 4 Wochen geben. Keine Lebendimpfung bei Schwangeren!

**G** Grundimmunisierung bis zu 4 Teilimpfungen G1 – G4

**S** Standardimpfung

**A** Auffrischungsimpfung

**N** Nachholimpfung  
Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

- a Frühgeborene (<37. SSW) erhalten eine zusätzliche Impfung im Alter von 3 Monaten (insgesamt also 4 Impfungen). Im Kindesalter den Konjugatimpfstoff, ab 60 Jahren den Polysaccharidimpfstoff verwenden.
- b 1. Impfung ab der 6. Lebenswoche, je nach Impfstoff zwei (Rotarix®) bzw. drei Dosen (RotaTeq®) mit einem Mindestabstand von 4 Wochen.
- c 1. MMR-Impfung gleichzeitig mit Varizellen-Impfung, aber an anderer Körperstelle; 2. Impfung als MMRV-Kombinationsimpfung (in einer Injektion).
- d Bei der nächsten Tetanus- und Diphtherie-Auffrischung zusätzlich Pertussis einmalig impfen.
- e Alle nach 1970 Geborenen mit unklarem Impfstatus, nur einer oder keiner Impfung. Vorzugsweise als MMR-Kombinationsimpfung. Zwei Impfungen im Alter von 9 bis 14 Jahren mit einem Impfabstand von 5 Monaten. Bei einem Impfabstand <5 Monaten oder einem Beginn der Impfserie >14 Jahren ist eine 3. Impfung notwendig.
- f Jährliche Impfung im Herbst: Alle Personen ab dem 60. Lebensjahr und chronisch Kranke ab dem 6. Lebensmonat. Einmalige Impfung bei Schwangeren ab dem 2. Trimenon.