


A close-up photograph of several green pea pods. The pods are bright green and appear fresh. The background is a soft-focus field of more pea pods. In the bottom right corner, there is a stylized green leaf graphic that curves upwards and to the left, partially overlapping the white background.

Groch

Asortyment na sezon 2015

Groch typu DLW – duży kaliber, ciemnozielony, marszczony

Odmiana	Termin dojrzwania (ilość dni relatywnie od odmiany Avola)	Typ rośliny	Średnia wysokość roślin (cm)	1-szy węzeł z kwiatami	Ilość strąków w węźle	Typ nasion	Rozkład frakcji wielkości nasion przy 100 JT							AIS (100JT)	Odporności									
							II <8,2	III 8,2/8,75	IV 8,75/9,2	V 9,2/10,3	VI >10,3	Średnia II-VI	Fop. 1		Fop. 2	BLRV	BYMV	Ep	PEMV	Aps	Pv			
SALINERO	-1	N	65	8–9	1–2	M	15%	15%	25%	30%	15%	4,15	HR	12,4	HR		HR					IR		
AVOLA	0	N	65	9–10	1–2	M	5%	10%	20%	30%	35%	4,80	HR	12,1	HR									
SHERWOOD	1	N	65	9	2	M	15%	15%	30%	25%	15%	4,10	HR	12,4	HR		HR					IR		
CABREE	1	N	50	9–10	1–2	M	17%	18%	25%	27%	13%	4,01	HR	12,6	HR									
MASTERFON	2	N	65	9–10	1–2	M	25%	20%	20%	25%	10%	3,75	HR	13,0	HR									
TALBOT	2	N	60	9–10	2	M	9%	11%	21%	31%	28%	4,58	HR	13,5	HR	IR								
SV0956QH NOWOŚĆ	2	N	65	10	2	2xM	20%	20%	25%	25%	10%	3,85	HR	11,5	HR		HR					IR		
PA0826	3	N	65	11	2–3	2xM	39%	23%	21%	12%	5%	3,01	HR	11,3	HR	HR	HR					IR		
SV0955QH NOWOŚĆ	4	N	70	11	2	2xM	24%	17%	21%	25%	14%	3,88	HR	11,8	HR	HR	HR					IR		
MILOR	6	N	70	12–13	2–3	M	8%	7%	12%	30%	43%	4,93	HR	12,2	HR									
SV0969QH NOWOŚĆ	7	N	65	11	3	2xM	38%	28%	20%	11%	4%	3,16	HR	11,3	HR	HR	HR					IR		
AZARRO	8	N	70	13	2–3	M	18%	18%	25%	25%	13%	3,96	HR	13,1	HR		HR					IR		
SV1033QF NOWOŚĆ	8	N	70	13	2-3	M	8%	13%	21%	31%	27%	4,56	odporności w fazie doświadczalnej											
ASHTON	9	N	70	14	2–3	M	13%	14%	26%	30%	17%	4,24	HR	13,1	HR		HR	HR				IR		
TRISTAR	10	N	70	13–14	2–3	M	5%	10%	20%	35%	30%	4,75	HR	13,7	HR									
DURANGO	10	N	70	13–14	2–3	M	13%	13%	26%	31%	17%	4,26	HR	12,9	HR		HR	HR						
FRILA	11	N	80	15	2	M	7%	8%	15%	37%	33%	4,81	HR	13,2	HR									
SV0893QF	11	N	65	14	2–3	M	9%	12%	24%	37%	19%	4,44	HR	14,6	HR		HR	HR				IR		
RESAL	12	N	75	15	3	M	10%	10%	17%	28%	35%	4,68	HR	14,3	HR			HR						
SV1022QG NOWOŚĆ	13	N	75	15–16	3	M	16%	17%	21%	28%	18%	4,15		13,4				HR						
TRILOGY	13	N	70	16	2–3	M	13%	11%	16%	29%	31%	4,54	HR	13,0	HR		HR	HR	HR					
HYPERION	13	A	65	15	2–3	M	25%	20%	25%	20%	10%	3,70	HR	13,0	HR	HR		HR	HR			IR		
PROMETHEUS	16	N	70	15	2–3	M	16%	16%	21%	29%	18%	4,17	HR	14,5	HR		HR	HR	HR			IR		
MAURICE	17	A	70	16	2–4	2xM	30%	20%	20%	20%	10%	3,60	HR	12,0	HR			HR	HR	HR	HR	IR		

Publikowane dane odzwierciedlają wyniki uzyskane w doświadczeniach w Europie i mogą różnić się w zależności od lokalnych warunków klimatycznych i technologii uprawy.

Groch typu DGI – średni kaliber, ciemnozielony

Odmiana	Termin dojrzewania (ilość dni relatywnie od odmiany Avola)	Typ rośliny	Średnia wysokość roślin (cm)	1-szy węzeł z kwiatami	Ilość strąków w węźle	Typ nasion	Rozkład frakcji wielkości nasion przy 120 JT						AIS (120JT)	Odporności							
							I <7,5	II 7,5/8,2	III 8,2/8,75	IV 8,75/9,2	V >9,2	Średnia I-V		Fop: 1	Fop: 2	BLRV	BYMV	Ep	PEMV	Aps	Pv
CRESCENDO	2	N	70	10–11	2	M	10%	15%	30%	30%	15%	3,25	14,5	HR			HR				IR
VINCO	5	N	65	10–11	2–3	M	10%	15%	30%	25%	20%	3,30	14,5	HR	HR						
ABADOR	9	N	70	13–14	2–3	M	10%	20%	30%	25%	15%	3,15	14,0		HR	IR					
DELTAFOX	10	N	70	13	2–3	M	5%	15%	25%	30%	25%	3,55	15,5	HR							
AGAMEMNON	10	N	70	17–18	2–3	2xM	20%	25%	30%	20%	5%	2,65	14,0	HR	HR		HR				
PERSEPHONE	11	A	65	16	2–3	M	6%	12%	21%	29%	32%	3,69	15,5		HR		HR	HR		HR	IR

Groch typu DGS – mały kaliber, ciemnozielony

Odmiana	Termin dojrzewania (ilość dni relatywnie od odmiany Avola)	Typ rośliny	Średnia wysokość roślin (cm)	1-szy węzeł z kwiatami	Typ nasion	Rozkład frakcji wielkości nasion przy 120 JT						AIS (120JT)	Odporności							
						I <7,5	II 7,5/8,2	III 8,2/8,75	IV 8,75/9,2	V >9,2	Średnia I-V		Fop: 1	Fop: 2	BLRV	BYMV	EP	PEMV	APS	PV
ORLANDO	0	N	70	9–10	G	20%	30%	30%	10%	10%	2,60	20,0	HR							
SV0983QC NOWOŚĆ	6	N	60	11	2xM	40%	35%	15%	10%		1,95	13,0	HR			HR				IR
SV0984QC NOWOŚĆ	9	N	60	13	M	45%	35%	15%	5%		1,80	15,0	HR			HR				IR
SPARTIATE	9	N	65	13	M	50%	35%	10%	5%		1,70	15,0	HR							IR
SV1322QC	10	N	65	14	M	45%	35%	15%	5%		1,80	16,0	HR	HR		HR				IR
XP 08270944 NOWOŚĆ	14	N	70	16	2xM	40%	40%	15%	5%		1,85	14,5	HR	HR		HR	HR			IR

Groch typu LGS – mały kaliber, jasnozielony

Odmiana	Termin dojrzewania (ilość dni relatywnie od odmiany Avola)	Typ rośliny	Średnia wysokość roślin (cm)	1-szy węzeł z kwiatami	Typ nasion	Rozkład frakcji wielkości nasion przy 140 JT						AIS (140JT)	Odporności							
						I <7,5	II 7,5/8,2	III 8,2/8,75	IV 8,75/9,2	V >9,2	Średnia I-V		Fop: 1	Fop: 2	BLRV	BYMV	Ep	PEMV	Aps	Pv
WILLEMO	3	N	50	10–11	G	30%	35%	25%	10%		2,15	22,7	HR							
XP 08260882 NOVOŚĆ	5	N	50	11	M	45%	35%	25%	5%		1,91	17,5	HR			HR			HR	IR
SV1084QJ	9	N	65	12	M	40%	40%	15%	5%		1,85	19,0	HR	HR				HR		IR
ULTIMO	16	N	55	15	M	40%	30%	20%	10%		2,00	18,4	HR	HR		HR				

Publikowane dane odzwierciedlają wyniki uzyskane w doświadczeniach w Europie i mogą różnić się w zależności od lokalnych warunków klimatycznych i technologii uprawy.

Objaśnienia

	Symbol	Znaczenie
typ rośliny	N	normalne ulistnienie
	A	Afila - ulistnienie zredukowane
	A(det)	Afila – samokończący
	A(fas)	Afila-fasciated – wiązanie strąków w górnej części rośliny
typ nasion	G	gładkie
	M	marszczone
	2xM	Allela podwójnego marszczenia
odporności na choroby	HR	odporność wysoka
	IR	odporność umiarkowana
choroby	Fop: 1, 2	Fusarium wilt (<i>Fusarium oxysporum f.sp. Pisi</i>) Races 1 and 2 – fuzaryjne więdnienie grochu, rasa 1 lub 2
	BLRV	Bean Leaf Roll Virus (<i>Pea leaf roll and pea top yellows</i>) – wirus zwijania liści grochu
	BYMV	Bean Yellow Mosaic Virus (<i>Strain pea</i>) – wirus żółtej mozaiki fasoli
	Ep	Powdery mildew (<i>Erysiphe pisi</i>) – mączniak prawdziwy
	PEMV	Pea Enation Mosaic Virus – wirus ostrej mozaiki grochu
	Aps	Ascochyta leaf and pod spot (<i>Ascochyta pisi</i>) – askochytoza grochu
	Pv	Downy mildew (<i>Peronospora viciae</i>) – mączniak rzekomy
	AIS	wskaźnik zawartości części stałych nierozpuszczalnych w alkoholu

REGIONALNI MENEDŻEROWIE HANDLOWI

RADOSŁAW GRABOWSKI

Rejon Polski Północnej
Współpraca z przemysłem przetwórczym
tel. kom. 664 143 543
radoslaw.grabowski@monsanto.com

PAWEŁ SKRZYNECKI

Rejon Polski Zachodniej
tel. kom. 664 196 396
pawel.skrzynecki@monsanto.com

MARCIN PORTKA

Rejon Polski Wschodniej
tel. kom. 601 311 460
marcin.portka@monsanto.com

PIOTR DUTKOWSKI

Region Polski Centralnej
tel. kom. 660 507 692
piotr.dutkowski@monsanto.com

ANNA WOJCIECHOWSKA

Region Polski Południowej
tel. kom. 606 317 500
anna.wojciechowska@monsanto.com

BIURO GŁÓWNE W WARSZAWIE

MONSANTO Polska Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa
tel. (22) 395 65 31, (22) 395 65 33
fax (22) 395 65 01
www.seminis.com.pl

TWÓJ DYSTRYBUTOR NASION

Wszelkie informacje na temat odmian i ich właściwości przekazywane ustnie lub na piśmie przez firmę Monsanto, jej pracowników lub przedstawicieli są informacjami przekazywanymi w dobrej wierze. Firma Monsanto nie udziela żadnych gwarancji co do właściwości i przydatności sprzedawanych odmian. Wzrost roślin uzależniony jest od warunków klimatycznych i innych czynników. Firma Monsanto nie ponosi odpowiedzialności za przekazywane informacje.

Groch. Asortyment na sezon 2015

© Monsanto Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone 01/2015

