



Pär Samuelsson, diab.ssk
Utvecklingsledare, NDR


Antal rapporterade individer till Nationella Diabetesregistret, år 1996 - 2015



Täckningsgrad

Jmf mellan NDR och läkemedelsregistret. Individer som har registrerats i LMR under år 2014 och som återfinns i NDR under perioden 2014-2015 (individer i åldrarna 50-80 år).

%



Medelvärde HbA1c

mmol/mol



Riskfotkategorier i NDR

- ① - Frisk fot - diabetes utan komplikationer
- ② - Neuropati, angiopati - perifer kärlsjukdom
- ③ - Tidigare diabetssår, fotdeformiteter, grav callus, amputerad
- ④ - Pågående allvarlig fotsjukdom - Sår, kritisk ischemi, infektion, grav osteoartropati, charcot-fot

Nationella riktlinjer 2015

För indikatorn **fotundersökningar** bland personer med typ 1- och typ 2-diabetes har Socialstyrelsen fastställt **målnivån till ≥ 99 procent**

Andelen med utförd kontroll av fotstatus under det senaste året

%



Andelen med utförd kontroll av fotstatus under det senaste året, jmf landsting



Fördelning per riskfotkategori – Primärvården



Fördelning per riskfotkategori – Medicinkliniker, typ 1-diabetes



Fördelning per riskfotkategori och olika HbA1c-nivåer– Primärvården

HbA1c <52

HbA1c >70

Fördelning per riskfotkategori och olika HbA1c-nivåer – Medicinkliniker, typ 1-diabetes

HbA1c <52

HbA1c >70

Fördelning av riskfotkategorier uppdelat enligt intervall för diabetesduration – PV

%



Fördelning av riskfotkategorier uppdelat enligt intervall för diabetesduration – MKT1

%

